



Dihydrotestosteron utvärtes 2,5 %

(Andractim Licens) gel

ADMINISTRERINGSSÄTT

Utvärtes: Påstrykes tunt på penis och/eller pung en gång om dagen, på kvällen.
Använd handskar och tvätta händerna noggrant efter administrering.
Låt lufttorka ca 5 min innan blöja/kläder tas på.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Andractim (licensprodukt)

2,5 %, Gel

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur, ljuskänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Stimulera utveckling av manliga genitalia

Ordineras av specialist i barnendokrinologi, DSD team

Spädbarn: 0,1 - 0,3 mL x 1

Tonåringar: 2 - 3 mL x 1

Endast aktuellt att behandla dessa åldersgrupper.

REFERENS/LÄNK

Internetadress Dihydrotestosterone (Andractim) 2.5 % gel for topical application.
Medicines information sheet, Great Ormond Street Hospital for Children

<https://www.gosh.nhs.uk/medical-information/medicines-information/dihydrotestosterone-andractim-25-gel-topical-application>

PubMed PMID Charmandari et al: Kinetics and effect of percutaneous administration of dihydrotestosterone in children. 2001

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11910204>

Rekommendation (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-09-08

ePedID: 3394

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-09-08

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-09-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT