

Paracetamol oralt

(ex Alvedon, Panodil)

Överväg dosreduktion om patienten har en leverpåverkan eller är kraftigt dehydrerad.

Administreringssätt

Oralt: Vid dagkirurgi ges första dosen paracetamol oralt 2 timmar före operation eller efter narkosinledningen.

Enteralt i sond: Munsönderfallande tabletter går att ge i sond efter upplösning i vatten.

"Vanliga" tabletter kan krossas och pulvret dispergeras i vatten.

Brustabletter löser upp sig omedelbart i en liten volym vatten.

Vanlig indikation och dos

Barn: Feber

15 mg/kg x 4

max 75 mg/kg/dygn eller 4000 mg/dygn

Barn: Smärta

Reducera dygnsdosen med 25% efter 2 - 3 dygn.

Laddningsdos:

Barn 0 - 2 mån: 30 mg/kg

Barn över 2 mån: 30 - 40 mg/kg

Smärtdos - Underhållsdos:

Barn 0 - 2 mån: 20 - 25 mg/kg x 3

Barn över 2 mån: 25 mg/kg x 4

Maxdos till barn under 40 kg: 100 mg/kg/dygn

Maxdos till barn över 40 kg: 4000 mg/dygn

Övrig information

Överdoserings av paracetamol med modifierad frisättning (tabletter 665 mg) är oförutsägbar och standardrutiner för provtagning och behandling är otillräckliga. Kontakta Giftinformationscentralen vid sådana fall.

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-11-11 13:34:40

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-11-11 13:34:33

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3400

ID/spårnummer: 1711

Giltig fr o m: 2016-11-11 13:34:33

Utskriftsdatum: 2016-11-11

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Paracetamol oralt

(ex Alvedon, Panodil)

Detta blad gäller för paracetamolinnehållande preparat, tabletter, tabletter med modifierad frisättning samt munsönderfallande tabletter.

Referens/Länk

BNF-C

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnfclegacy/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Dosering av paracetamol till barn

http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/info_fr_LV_2009-6.pdf

Internetadress Nya riktlinjer vid överdos med Alvedon 665 mg med modifierad frisättning. Läkemedelsverket

<https://lakemedelsverket.se//Alla-nyheter/NYHETER-2016/Nya-riktlinjer-vid-overdos-med-Alvedon-665-mg-med-modifierad-frisattning/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Paracetamol, N02BE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POC2U97HOVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-11-11 13:34:40
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-11-11 13:34:33
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3400
ID/spårnummer: 1711
Giltig fr o m: 2016-11-11 13:34:33
Utskriftsdatum: 2016-11-11

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

