



Paracetamol oralt

(ex Alvedon, Panodil)

Överväg dosreduktion om patienten har en leverpåverkan eller är kraftigt dehydrerad.

Reducera dygnsdosen med 25% efter 2 - 3 dygn.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

tablett 500 mg och 1 g, munsönderfallande tablett 250 och 500 mg, brustablett 500 mg, pulver till oral lösning 500 mg samt granulat i dospåse 250 och 500 mg.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Vid dagkirurgi ges första dosen paracetamol oralt 2 timmar före operation eller efter narkosinledningen.

Pulvret ska lösas upp i en stor kopp kokande vatten. Vätskan dricks när den har nått lämplig temperatur.

Granulaten bör tas direkt i munnen, på tungan, och sväljas utan vatten.

Enteralt i sond:

Munsönderfallande tabletter går att ge i sond efter upplösning i vatten.

"Vanliga" tabletter kan krossas och pulvret dispergeras i vatten.

Brustabletter löser upp sig omedelbart i en liten volym vatten.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Smärta (inkl huvudvärk och migrän)

Laddningsdos

Barn 1 - 2 mån: 30 mg/kg

Barn över 2 mån: 30 - 40 mg/kg

Underhållsdos

Barn 1 - 2 mån: 20 - 25 mg/kg x 3

Barn över 2 mån: 25 mg/kg x 4

Maxdos

Barn 1 - 2 mån: Max 75 mg/kg/dygn

Barn över 2 mån: Max 90 mg/kg/dygn, max 4 g/dygn

Barn över 50 kg (om friskt barn): Max 6 g/dygn, efter 2 - 3 dygn max 4 g/dygn

Feber

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 4, max 60 mg/kg/dygn

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Dosering av paracetamol till barn

http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/Info_fr_LV_2009-6.pdf

Internetadress Läkemedelsverket, Behandlingsrekommendation Långvarig smärta hos barn och vuxna

<https://lv.se/langvarig-smarta>

Internetadress Läkemedelsverket, Paracetamol till barn

lv.se/paracetamol-barn

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Paracetamol oralt

(ex Alvedon, Panodil)

ÖVRIG INFORMATION

Brustablett 500 mg innehåller ca 427 - 503 mg natrium per tablett (beroende på tillverkare), detta kan ha klinisk betydelse beroende på patientens tillstånd.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Paracetamol (ex Alvedon) (registrerad produkt)

250 mg, Munsönderfallande tablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Vissa tillverkare anger att preparatet är fuktkänsligt. Gäller styrkorna 250 och 500 mg

500 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller styrkorna 500 mg och 1 g.

500 mg, Brustablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

500 mg, Pulver till oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

500 mg, Granulat, dospåse

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt. Gäller styrkorna 250 och 500 mg

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-06-21

ePedID: 3400

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-06-27

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-06-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT