



Diklofenak rektalt

(ex Voltaren) suppositorier

Diklofenak är miljöbelastande. Överväg annat NSAID-preparat.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Suppositorier 25 resp. 50 mg (Diklofenak Mylan, Voltaren).
Suppositorie 12,5 mg (Voltaren licens).

ADMINISTRERINGSSÄTT

Rektalt: Suppositorier ska inte delas.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Diclofenak (ex Voltaren) (registrerad produkt)

25 mg, Suppositorium

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Gäller även 50 mg.

Diklofenak (Voltaren) (licensprodukt)

12,5 mg, Suppositorium

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Postoperativ smärta, akut smärta, inflammation

Barn över 3 mån: 1 - 2 mg/kg x 2 - 3, max 50 mg/dos, max 150 mg/dygn.

Fast dosering:

Barn 8 - 12 kg: 12,5 mg x 2

Barn 13 - 25 kg: 25 mg x 2

Barn 26 - 50 kg: 50 mg x 2

Barn över 50 kg: 50 mg x 3

Behandlingstid max 4 dygn vid postoperativ smärta.

Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Barn över 6 mån: 1,5 - 2,5 mg/kg x 2 - 3, max 75 mg/dos, max 150 mg/dygn.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-11-15

ePedID: 3403

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-12-12

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-12-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT