



## Diklofenak rektalt

(ex Voltaren) suppositorier

**Försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion, gastroenterit och långvarig feber.**

**Diklofenak är miljöbelastande. Överväg annat NSAID-preparat.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Suppositorier 25 resp. 50 mg (ex Voltaren)  
Licensläkemedel suppositorium 12,5 mg

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Rektalt: Suppositorier ska inte delas.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Diclofenak (ex Voltaren) (registrerad produkt)

25 mg, Suppositorium

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Gäller även 50 mg.

#### Diklofenak (Voltaren) (licensprodukt)

12,5 mg, Suppositorium

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Postoperativ smärta, akut smärta, inflammation

Barn över 3 mån: 1 - 2 mg/kg x 2 - 3, max 50 mg/dos, max 150 mg/dygn.

Fast dosering:

Barn 8 - 12 kg: 12,5 mg x 2

Barn 13 - 25 kg: 25 mg x 2

Barn 26 - 50 kg: 50 mg x 2

Barn över 50 kg: 50 mg x 3

Behandlingstid max 4 dygn vid postoperativ smärta.

#### Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Barn över 6 mån: 1,5 - 2,5 mg/kg x 2 - 3, max 75 mg/dos, max 150 mg/dygn.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-04-25

ePedID: 3403

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-04-25

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-04-25

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**