



Diklofenak rektalt

(ex Voltaren) suppositorier

Försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion, gastroenterit och långvarig feber.

Diklofenak är miljöbelastande. Överväg annat NSAID-preparat.

Ökad blödningsbenägenhet, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Suppositorier 25 och 50 mg (ex Voltaren)
Suppositorium 12,5 mg (Voltaren licens)

ADMINISTRERING

Rektalt: Suppositorier ska inte delas.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Diclofenak (registrerad produkt)

Suppositorium

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor.

Diklofenak (licensprodukt)

Suppositorium

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Postoperativ smärta, akut smärta, inflammation

Barn från 3 mån: 1 - 2 mg/kg x 2 - 3, max 50 mg/DOS, max 150 mg/DYGN

Fast dosering:

Barn 8 - 12 kg: 12,5 mg x 2

Barn 13 - 25 kg: 25 mg x 2

Barn 26 - 50 kg: 50 mg x 2

Barn över 50 kg: 50 mg x 3

Behandlingstid max 4 dygn vid postoperativ smärta.

Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Barn från 6 mån: 1,5 - 2,5 mg/kg x 2 - 3, max 75 mg/DOS, max 150 mg/DYGN

ÖVRIG INFORMATION

Inför procedurer (som t.ex. LP) ska diklofenak ges senast 12 timmar innan, detta pga ökad blödningsbenägenhet.

Allvarliga akuta astmaanfall kan förvärras av diklofenak. Läkemedlet kan dock ges till en majoritet av barn med astmadiagnos efter utvärdering av första dos på sjukhuset.





Diklofenak rektalt (ex Voltaren) suppositorier

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress Internetmedicin - Smärta, akut och procedurrelaterad – barn och ungdomar

<https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/smarta/smarta-akut-och-procedurrelaterad-barn-och-ungdomar/>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Breivik H et al. Nordic guidelines for neuraxial blocks in disturbed haemostasis from the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 Jan;54(1)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19839941>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 3403

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-03-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT