



## Diklofenak rektalt

(ex Voltaren) suppositorier

**Försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion, gastroenterit och långvarig feber.**

**Diklofenak är miljöbelastande. Överväg annat NSAID-preparat.**

**Ökad blödningsbenägenhet, se Övrig information.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Suppositorier 25 och 50 mg (ex Voltaren)  
Suppositorium 12,5 mg (Voltaren licens)

### ADMINISTRERING

Rektalt: Suppositorier ska inte delas.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Diclofenak (registrerad produkt)

Suppositorium

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.

#### Diklofenak (licensprodukt)

Suppositorium

Förvaras vid högst 25 °C.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Postoperativ smärta, akut smärta, inflammation

Barn från 3 mån: 1 - 2 mg/kg x 2 - 3, max 50 mg/DOS, max 150 mg/DYGN

Fast dosering:

Barn 8 - 12 kg: 12,5 mg x 2

Barn 13 - 25 kg: 25 mg x 2

Barn 26 - 50 kg: 50 mg x 2

Barn över 50 kg: 50 mg x 3

Behandlingstid max 4 dygn vid postoperativ smärta.

#### Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Barn från 6 mån: 1,5 - 2,5 mg/kg x 2 - 3, max 75 mg/DOS, max 150 mg/DYGN

### ÖVRIG INFORMATION

Diklofenak kan ge en ökad blödningsbenägenhet, efter intag av diklofenak bör det därför gå minst 12 timmar innan procedur (som t.ex. LP) utförs.

Allvarliga akuta astmaanfall kan förvärras av diklofenak. Astmadiagnos i sig är dock inget hinder för att ordinera diklofenak.





## Diklofenak rektalt (ex Voltaren) suppositorier

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress Kortfattad översikt över antikoagulantia och ryggbedövning

[https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-5b\\_Kortfattad\\_oversikt\\_over\\_antikoagulantia\\_och\\_ryggbedovning\\_110328.pdf](https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-5b_Kortfattad_oversikt_over_antikoagulantia_och_ryggbedovning_110328.pdf)

Internetadress Ryggbedövning och antikoagulantia

[https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/anestesi/ryggbedovning-och-antikoagulantia/Pediatric\\_Dosage\\_Handbook](https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/anestesi/ryggbedovning-och-antikoagulantia/Pediatric_Dosage_Handbook)

PubMed PMID Breivik H et al. Nordic guidelines for neuraxial blocks in disturbed haemostasis from the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 Jan;54(1)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19839941>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3403](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3403)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 3403

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-09-25

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**