

Teikoplanin intravenös inj, inf 133,3 mg/mL (ex. Targocid), spädning från 400 mg

Stor risk för förväxling, flera styrkor finns.

En-stegsspädning:	Targocid		Sterilt Vatten		INJ
	400 mg	+		=	133,3 mg/mL
	1 st		3,2 mL		3,2 mL

Beredningsinstruktion: Lös upp en flaska teikoplanin 400 mg med 3,2 mL vatten för injektionsvätska. Tillsätt vattnet långsamt och rulla försiktigt injektionsflaskan mellan händerna tills pulvret är helt upplöst. Om det bildas skum bör lösningen stå i cirka 15 minuter.

Flaskan är överfylld med pulver och därför kommer den beredda lösningen att innehålla 400 mg teikoplanin i 3,0 mL, dvs lösningens koncentration är 133,3 mg/mL.

Om teikoplanin ska ges som infusion ska ordinerad dos av det upplösta pulvret spädas vidare med natriumklorid 9 mg/mL eller glukos 50 mg/mL.

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringssätt

Intravenös injektion: Ges som långsam injektion under 3 - 5 minuter. Till nyfödda bör teikoplanin ges som infusion.

Intravenös infusion: Ges under 30 minuter.

Vanlig indikation och dos

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-09-23 16:10:30
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-10-04 15:49:14
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3405
ID/spårnummer: 1577
Giltig fr o m: 2016-10-04 15:49:14
Utskriftsdatum: 2016-10-04

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Teikoplanin intravenös inj, inf 133,3 mg/mL

(ex. Targocid), spädning från 400 mg

Grampositiva infektioner inklusive endokardit samt infektioner orsakade av stafylockocker aureus.

Nyfödda

Laddningsdos: 16 mg/kg, 1 enskild dos

Underhållsdos: 8 mg/kg x 1

Barn över 1 månad med vikt under 40 kg

Laddningsdos: 10 mg/kg, var 12:e timme, max 400 mg. Ge 3 doser, sedan underhållsdos

Underhållsdos: 6 mg/kg x 1, max 400 mg

Barn över 1 månad med vikt mer än 40 kg

Laddningsdos: 400 mg eller 800 mg, var 12:e timme, upprepas 3 - 5 gånger beroende på indikation

Underhållsdos: 6 mg/kg x 1 eller 12 mg/kg x 1 beroende på indikation

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
6 mg/kg				2,3 mL
12 mg/kg				4,5 mL

Hållbarhet preparat:

Targocid (Registrerad Produkt)

● 133,3 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

Hållbar: färdigberedd injektionslösning och spädd infusionslösning 24 timmar i kylskåp.

Övrig information

Allvarliga livshotande överkänslighetsreaktioner har rapporterats. Om läkemedlet ges som intravenös infusion minskar risken för allergiska reaktioner.

För patienter med vikt under ca 25 - 35 kg, beroende av dos, rekommenderas teikoplanin 200 mg, se då annan läkemedelsinstruktion.

I FASS-texten för Targocid anges att pulvret ska lösas i 3,14 mL vatten för injektionsvätska. I denna beredningsinstruktion anges 3,2 mL, enligt tidigare FASS-text för Targocid samt gällande produktresumé för Teicoplanin Sandoz, då detta är en mer lätthanterlig volym.

Doseringen bör anpassas efter njurfunktionen.

Den beredda injektionslösningen kan administreras oralt.

Referens/Länk

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-09-23 16:10:30
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-10-04 15:49:14
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3405
ID/spårnummer: 1577
Giltig fr o m: 2016-10-04 15:49:14
Utskriftsdatum: 2016-10-04

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Teicoplanin intravenös inj, inf 133,3 mg/mL (ex. Targocid), spädning från 400 mg

BNF-C , Hämtat: 2016-09-23

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnfclegacy/current/>

FASS , Hämtat: 2016-09-23

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress SPC Teicoplanin Sandoz, Hämtat: 2016-09-23

<https://lakemedelsverket.se/LMF/Lakemedelsinformation/?nplid=20110405000025&type=product>

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2016-10-04

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Teicoplanin, J01XA02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POF8UAT0ZVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-09-23 16:10:30
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-10-04 15:49:14
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3405
ID/spårnummer: 1577
Giltig fr o m: 2016-10-04 15:49:14
Utskriftsdatum: 2016-10-04

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

