



Teikoplanin intravenös inf/inj 133,3 mg/mL

(ex Targocid) spädning från 400 mg

Stor risk för förväxling, flera styrkor finns.

EN-STEGSSPÄDNING

Targocid		Sterilt Vatten		INJ
400 mg				
1 st	+	3,2 mL	=	133,3 mg/mL
				3,2 mL

Beredningsinstruktion:

Tillsätt 3,2 mL vatten för injektionsvätska långsamt och rulla försiktigt injektionsflaskan mellan händerna tills pulvret är helt upplöst. Om det bildas skum bör lösningen stå i cirka 15 minuter.

Från vissa tillverkare medföljer sterilt vatten.

Flaskan är överfylld med pulver och därför blir den beredda lösningens koncentration 133,3 mg/mL efter tillsats av 3,2 mL.

Om teikoplanin ska ges som infusion ska ordinerad dos av det upplösta pulvret spädas vidare med natriumklorid 9 mg/mL eller glukos 50 mg/mL.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: Ges som långsam injektion under 3 - 5 minuter. Till nyfödda bör teikoplanin ges som infusion.

Allvarliga livshotande överkänslighetsreaktioner har rapporterats. Om läkemedlet ges som intravenös infusion minskar risken för allergiska reaktioner.

Intravenös infusion: Ges under 30 minuter.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Allvarliga grampositiva infektioner inklusive endokardit samt infektioner orsakade av *Staphylococcus aureus*.

Nyfödda

Laddningsdos: 16 mg/kg

Underhållsdos: 8 mg/kg x 1

Barn över 1 månad - 12 år

Laddningsdos: 10 mg/kg, var 12:e timme, max 400 mg. Ge 3 doser, sedan underhållsdos

Underhållsdos: 6 mg/kg x 1, max 400 mg

Barn över 12 år

Laddningsdos: 400 mg eller 800 mg, var 12:e timme, upprepas 3 - 5 gånger

Underhållsdos: 6 - 12 mg/kg x 1

För patienter med vikt under ca 25 - 35 kg, beroende av dos, rekommenderas teikoplanin 200 mg, se annan instruktion.

RIMLIG DOS FÖR 133,3 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
6 mg/kg	-	-	-	2,25 mL
10 mg/kg	-	-	-	3,75 mL
12 mg/kg	-	-	-	4,5 mL

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Teicoplanin Sandoz

<https://lakemedelsverket.se/LMF/Lakemedelsinformation/?nplid=20110405000025&type=product>





Teikoplanin intravenös inf/inj 133,3 mg/mL

(ex Targocid) spädning från 400 mg

ÖVRIG INFORMATION

I FASS-texten för Targocid anges att pulvret ska lösas i 3,14 mL vatten för injektionsvätska. I denna beredningsinstruktion anges 3,2 mL, enligt tidigare FASS-text för Targocid samt gällande produktresumé för Teikoplanin Sandoz, då detta är en mer lätthanterlig volym.

Doseringen bör anpassas efter njurfunktionen.

Den beredda injektionslösningen kan administreras oralt.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Targocid (registrerad produkt)

133,3 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

HÅLLBAR: färdigberedd injektionslösning och spädd infusionslösning 24 timmar i kylskåp.

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2018-11-23

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-12-18

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 3405

Versionsnummer, major: 2

Giltig fr o m: 2018-12-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT