

# Metadon oralt

## (Metadon Abcur, Metadon Recip) tabletter

Denna instruktion gäller för metadoninnehållande tabletter 5 mg, 10 mg, 20 mg respektive 40 mg.

---

### Administreringsätt

Oralt:  
Tablett Metadon Abcur kan delas i två delar med lika stor dos i båda delarna.  
Tablett Metadon Recip kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att dela upp i mindre dos.

---

### Vanlig indikation och dos

**Långvariga och komplexa smärttillstånd, vanligen med neuropatisk komponent, som komplement till annan opioidbehandling för att förstärka den analgetiska effekten**

Dosförslag 0,1 mg/kg x 1 - 2

---

### Övrig information

Metadon har lång halveringstid och därför kan, vid annan doseringsregim än lågdos, doseringsintervallet behöva förlängas vid upprepad administrering. Detta för att undvika ackumulering.

---

### Referens/Länk

Pediatric Dosage Handbook

Personlig kontakt Stefan Lundeberg, öl Smärtbehandlingsenheten ALB

Rekommendation ,(Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjonet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3406](http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3406)

---

### Substansspecifika uppgifter

Methadone, N02AC02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POBYU94ILVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-03-31 09:57:55  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-04-04 10:57:32  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3406  
ID/spårnummer: 3068  
Giltig fr o m: 2017-04-04 10:57:32  
Utskriftsdatum: 2017-04-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

