



Metadon oralt

tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Metadon Abcur 5 mg, 10 mg, 20 mg och 40 mg
Metadon Orion 5 mg, 10 mg, 20 mg
Metadon Meda 10 mg

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:
Tablett Metadon Abcur kan delas i två delar med lika stor dos i båda delarna.
Tablett Metadon Meda kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att dela upp i mindre dos.

ÖVRIG INFORMATION

Denna instruktion avser lågdos-behandling med metadon. Vid högre dosering kan doseringsintervallet behöva förlängas vid upprepad behandling eftersom metadon har lång halveringstid och det annars finns risk för ackumulering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Metadon (registrerad produkt)

5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.
Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Långvariga och komplexa smärttillstånd, vanligen med neuropatisk komponent, som komplement till annan opioidbehandling för att förstärka den analgetiska effekten

Barn 1 mån - 18 år: 0,1 mg/kg x 1 - 2

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus
<http://eped.se/referenser/>
Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2B)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-12-19	ePedID: 3406
Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-12-19	Versionsnummer, major: 2
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt	Giltig fr o m: 2018-12-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT