



Metadon oralt

(ex Metadon Abcur) tabletter

Vid behandling med metadon bör EKG tas då risk finns för QT-förlängning. Se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 5 mg, 10 mg, 20 mg och 40 mg (ex Metadon Abcur)

Denna instruktion är mest lämplig för barn från 25 kg. För mindre barn samt vid sväljsvårigheter, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt:

Tabletterna kan delas i två delar med lika stor dos i båda delarna. Förutom Metadon 2care4 10 mg som endast kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att dela upp i mindre dos.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Metadon (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor och fabrikat.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Denna instruktion är mest lämplig för barn från 25 kg. För lägre doser, se annan instruktion.

Långvariga och komplexa smärttillstånd, vanligen med neuropatisk komponent, som komplement till annan opioidbehandling för att förstärka den analgetiska effekten

Bör ordinerars i samråd med smärtspecialist

Barn 1 mån - 18 år: 0,1 mg/kg x 1 - 2

ÖVRIG INFORMATION

Metadon har lång halveringstid och doseringsintervallet kan behöva förlängas då det finns risk för ackumulering. Halveringstiden varierar med rapporterade värden på 16 - 62 timmar (nyfödda) och 4 - 62 timmar (barn).

Undvik samtidig behandling med läkemedel som hämmar CYP3A4 som t.ex. flukonazol samt erytromycin. Dessa läkemedel kan öka plasmakoncentrationen av metadon, vilket kan leda till en ökad QT-tid och därmed ökar risken för Torsades de Pointes. Även grapefrukt/grapefruktjuice är en potent hämmare av CYP3A4.

Undvik samtidig behandling med läkemedel som inducerar CYP3A4 som t.ex. fenobarbital. Dessa läkemedel kan leda till minskade plasmanivåer av metadon, vilket kan leda till opiatrelaterade utsättningssymtom.

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Metadon oralt

(ex Metadon Abcur) tabletter



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 3406

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-02-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT