



Diklofenak oralt

(ex Voltaren) tabletter

Försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion, gastroenterit och långvarig feber.

Diklofenak är miljöbelastande. Överväg annat NSAID-preparat.

Ökad blödningsbenägenhet, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Filmdragerade tabletter 25 och 50 mg (ex. Voltaren T)
Enterotabletter 25 och 50 mg (ex. Voltaren)

Denna instruktion är mest lämplig för större barn. För mindre barn finns suppositorium, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt: Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med vätska och får inte delas eller tuggas, intas helst före måltid. Passagen genom ventrikeln är snabbare om dosen tas före en måltid, men den absorberade mängden är densamma. Enterotabletter är överdragna med ett magsaftresistent skikt för att skydda magslemhinnan.

Enteralt: Snabbfrisättande tabletter kan krossas, lösas upp i vatten och administreras enteralt. Går även att administrera i jejunum.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Diklofenak (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

Enterotablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Postoperativ smärta, akut smärta, inflammation

Barn från 3 mån: 1 - 2 mg/kg x 2 - 3, max 50 mg/DOS, max 150 mg/DYGN

Fast dosering:

Barn 13 - 25 kg: 25 mg x 2

Barn 26 - 50 kg: 50 mg x 2

Barn över 50 kg: 50 mg x 3

Behandlingstid max 4 dygn vid postoperativ smärta.

Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Barn från 6 mån: 1,5 - 2,5 mg/kg x 2 - 3, max 75 mg/DOS, max 150 mg/DYGN

ÖVRIG INFORMATION

Diklofenak kan ge ökad blödningsbenägenhet, efter intag av diklofenak bör det därför gå minst 12 timmar innan procedur, som ryggstick, utförs.

Allvarliga akuta astmaanfall kan förvärras av diklofenak. Astmadiagnos i sig är dock inget hinder för att ordinera diklofenak.

Skillnaden mellan enterotabletter (ex Diklofenak) och filmdragerade tabletter (ex Diklofenak T) är att filmdragerade tabletter innehåller ett annat salt av diklofenak och har en annan dragering som gör att tillslagstiden blir något snabbare.





Diklofenak oralt (ex Voltaren) tabletter

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress Kortfattad översikt över antikoagulantia och ryggbedövning

[https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-](https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-5b_Kortfattad_oversikt_över_antikoagulantia_och_ryggbedovning_110328.pdf)

[5b_Kortfattad_oversikt_över_antikoagulantia_och_ryggbedovning_110328.pdf](https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-5b_Kortfattad_oversikt_över_antikoagulantia_och_ryggbedovning_110328.pdf)

Internetadress Ryggbedövning och antikoagulantia

<https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/anestesi/ryggbedovning-och-antikoagulantia/>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Breivik H et al. Nordic guidelines for neuraxial blocks in disturbed haemostasis from the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 Jan;54(1)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19839941>

PubMed PMID Kanabar D, Dale S, Rawat M. A review of ibuprofen and acetaminophen use in febrile children and the occurrence of asthma-related symptoms. Clin Ther. 2007 Dec;29(12):2716-23.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18201589>

PubMed PMID Kauffman RE, Lieh-Lai M. Ibuprofen and increased morbidity in children with asthma: fact or fiction? Paediatr Drugs. 2004;6(5):267-72.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15449966>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3407



Diklofenak oralt (ex Voltaren) tabletter



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 3407

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-10-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT