



## Diklofenak oralt

(ex Voltaren) kapsel/tabletter

**Försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion, gastroenterit och långvarig feber.**

**Diklofenak är miljöbelastande. Överväg annat NSAID-preparat.**

**Ökad blödningsbenägenhet, se Övrig information.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Filmdragerade tabletter 25 och 50 mg (ex. Voltaren T )  
Kapsel 25 mg (Voltaren T)  
Enterotabletter 25 och 50 mg (ex. Voltaren)

Denna instruktion är mest lämplig för större barn. För mindre barn finns suppositorium, se annan instruktion.

### ADMINISTRERING

Oralt: Enterotabletter, filmdragerade tabletter och mjuk kapsel måste sväljas hela och får inte delas eller tuggas.

Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med vätska, helst före måltid. Passagen genom ventrikeln är snabbare om dosen tas före en måltid, men den absorberade mängden är densamma.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Diclofenak (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor.

Enterotablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor.

Kapsel, mjuk

Förvaras i rumstemperatur, i originalförpackning. Ljuskänsligt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Postoperativ smärta, akut smärta, inflammation

Barn från 3 mån: 1 - 2 mg/kg x 2 - 3, max 50 mg/DOS, max 150 mg/DYGN.

Fast dosering:

Barn 13 - 25 kg: 25 mg x 2

Barn 26 - 50 kg: 50 mg x 2

Barn över 50 kg: 50 mg x 3

Behandlingstid max 4 dygn vid postoperativ smärta.

#### Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Barn från 6 mån: 1,5 - 2,5 mg/kg x 2 - 3, max 75 mg/DOS, max 150 mg/DYGN.

### ÖVRIG INFORMATION

Diklofenak kan ge en ökad blödningsbenägenhet, efter intag av diklofenak bör det därför gå minst 12 timmar innan procedur (som t.ex. LP) utförs.

Allvarliga akuta astmaanfall kan förvärras av diklofenak. Läkemedlet kan dock ges till en majoritet av barn med astmadiagnos efter utvärdering av första dos på sjukhuset.

Skillnaden mellan enterotabletter (ex Diklofenak) och filmdragerade tabletter (ex Diklofenak T) är att filmdragerade tabletter innehåller ett annat salt av diklofenak och har en annan dragering som gör att tillslags tiden blir något snabbare.



## Diklofenak oralt

(ex Voltaren) kapsel/tabletter



### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress Internetmedicin - Smärta, akut och procedurrelaterad – barn och ungdomar

<https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/smarta/smarta-akut-och-procedurrelaterad-barn-och-ungdomar/>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Breivik H et al. Nordic guidelines for neuraxial blocks in disturbed haemostasis from the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 Jan;54(1)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19839941>

Rekommendation , (Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 3407

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-03-29

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**