

Pamidronat intravenös inf

(ex Pamifos, f.d Aredia)

Uppvätskning och dosering är olika UNDER 1:a behandlingsåret och EFTER 1:a behandlingsåret.

Instruktionen gäller för: Tillsats av ordinerad volym pamidronatkoncentrat 3 mg/mL till spädningsvätska.

Beredningsinstruktion: UNDER 1:a behandlingsåret
- Doser upp till 10 mg
Ordinerad dos sätts till 100 mL glukos 50 mg/mL eller NaCl 9 mg/mL.

- Doser över 10 mg
Ordinerad dos sätts till 250 mL glukos 50 mg/mL eller NaCl 9 mg/mL.

EFTER 1:a behandlingsåret
Ordinerad dos sätts till buffrad glukos 25 mg/mL eller NaCl 9 mg/mL. Volym spädningsvätska: 500 mL/m².

Arbetsmiljö Allergirisk, hantera enligt lokal instruktion, -

Administreringsätt

UNDER 1:a behandlingsåret
Innan infusion: vätska upp patienten med buffrad glukos 25 mg/mL. Mängd: 500 mL/m², ges under 2 tim.
Intravenös infusion: Pamidronat ges under 4 tim

EFTER 1:a behandlingsåret
Ingen föregående uppvätskning.
Intravenös infusion: Pamidronat ges under 4 tim.

Vanlig indikation och dos

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-08-17 15:32:57
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-11-09 12:29:12
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3408
ID/spårnummer: 3876
Giltig fr o m: 2017-11-09 12:29:12
Utskriftsdatum: 2017-11-15

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Pamidronat intravenös inf

(ex Pamifos, f.d Aredia)

Osteogenesis imperfecta, osteoporos, fibrös dysplasi, CRMO

UNDER 1:a behandlingsåret

Barn från 1 mån:

- Behandling 1 - 2: 10 mg/m², 1 gång per månad.

- Behandling 3 - 5: 20 mg/m², 1 gång per månad.

- Behandling 6 och framåt: 30 mg/m², 1 gång per månad.

EFTER 1:a behandlingsåret

Barn från 1 mån: 30 - 40 mg/m², 1 gång per månad.

Rimlig dos för barn	0,5 m2	1 m2	1,5 m2	2 m2
10 mg/m ²	1,67 mL	3,33 mL	5 mL	6,67 mL
30 mg/m ²	5 mL	10 mL	15 mL	20 mL

Hållbarhet preparat:

Pamidronat (ex Hospira) (registrerad produkt)

● 3 mg/mL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras vid högst 25°C. Efter iordningställande: 12 tim rumstemperatur, 24 tim kylskåp.

Övrig information

Under 1:a behandlingsåret är det viktigt att patienten FÖRST uppvätskas för att minimera risken för biverkningar (ex feber och muskelvärk). Efter 1:a behandlingsåret har kroppen vant sig och läkemedlet kan ges utan föregående uppvätskning.

Får inte ges med kalciuminnehållande vätskor.

Osteonekros i käken har rapporterats hos patienter med cancer som får cytostatika och samtidigt behandlats med intravenöst pamidronat.

Pamidronat kan vara njurtoxiskt och därför är det viktigt att följa rekommenderad infusionstid och inte överstiga dosen 90 mg.

Saltformen av den aktiva substansen i dessa produkter namnges på olika sätt, pamidronatdinatrium och dinatriumpamidronat, men skiljer sig inte i effekt.

Referens/Länk

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-08-17 15:32:57

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-11-09 12:29:12

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3408

ID/spårnummer: 3876

Giltig fr o m: 2017-11-09 12:29:12

Utskriftsdatum: 2017-11-15

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Pamidronat intravenös inf (ex Pamifos, f.d Aredia)

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Pamidronic acid, M05BA03

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancId=IDE4POEZUALTQVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-08-17 15:32:57
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-11-09 12:29:12
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3408
ID/spårnummer: 3876
Giltig fr o m: 2017-11-09 12:29:12
Utskriftsdatum: 2017-11-15

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

