



Ranitidin oralt

(ex Zantac) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Brustabletter 150 mg och tabletter 150 samt 300 mg.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond: Använd oral lösning, se annan instruktion.

Brustabletten ska innan administrering lösas upp i minst 5 mL vatten.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ranitidin (ex Zantac) (registrerad produkt)

150 mg, Brustablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen vid högst 25°C (vissa tillverkare anger 30°C). Fuktkänsligt.

150 mg, Filmragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

300 mg, Filmragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Gastroesofagal refluxsjukdom (GERD)

Nyfödda: 0,5 - 1 (- 2) mg/kg x (3 -) 4, max 9 mg/kg/dygn

Barn 1 mån - 18 år: 2,5 - 5 mg/kg x 2, max 600 mg/dygn

Alternativt (fast dosering)

Barn över 30 kg: 150 mg x 2 alternativt 300 mg x 1

Reducera dosen vid nedsatt njurfunktion (GFR under 50 mL/min/1,73 m²).

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - GERD, Gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar - Vårdprogram

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-02-05

ePedID: 3412

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-21

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-02-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT