



Ranitidin oralt

(ex Zantac) tabletter

Ranitidin bör endast användas i undantagsfall och då som korttidsbehandling, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Brustablett 150 mg
Tabletter 150 och 300 mg

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond: Använd oral lösning, se annan instruktion.

Brustabletten ska innan administrering lösas upp i minst 5 mL vatten.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ranitidin (ex Zantac) (registrerad produkt)

150 mg, Brustablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen vid högst 25 °C (vissa tillverkare anger 30 °C). Fuktkänsligt.

150 mg, Filmraderad tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även 300 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Gastroesofagal refluxsjukdom (GERD)

Barn 1 mån - 18 år: 2,5 - 5 mg/kg x 2, max 600 mg/dygn

Alternativt (fast dosering)

Barn över 30 kg: 150 mg x 2 alternativt 300 mg x 1

Reducera dosen vid nedsatt njurfunktion (GFR under 50 mL/min/1,73 m²).

Kronisk urtikaria/svår klåda (låg evidens)

Barn över 30 kg: 150 mg x 2, max 300 mg/dygn

ÖVRIG INFORMATION

Perorala läkemedel innehållande ranitidin har dragits in från marknaden som en tillfällig försiktighetsåtgärd. Detta efter att det påvisats att de innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett sannolikt cancerframkallande ämne. Ranitidin bör endast användas i undantagsfall, när det saknas andra lämpliga alternativ, och då som korttidsbehandling.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Nyhet - Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas

<https://lakemedelsverket.se/>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Fedorowicz Z et al. Histamine H2-receptor antagonists for urticaria.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22419335>

Rekommendation , (Grade 2A)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Sektionen för barn- och ungdomsallergi - Urticaria Utredning och behandling

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/D5_urtikaria.pdf

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - GERD

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3412



Ranitidin oralt

(ex Zantac) tabletter



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-10-03
Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-10-03
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 3412
Versionsnummer, major: 3
Giltig fr o m: 2019-10-02

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT