

Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 alt 10 mg

Denna instruktion gäller för Diazepam Desitin rektallösning (5 och 10 mg), Stesolid suppositorium (5 och 10 mg) samt Stesolid rektallösning (5 och 10 mg).

Administreringsätt

Rektalt: Vid administrering ska barnet ligga framstupa eller på sidan.

För barn under 3 år (alt under 15 kg) ska halva spetsen på tuben föras in.

Den lilla volym lösning som finns kvar i tuben har ingen betydelse för korrekt dosering. Håll tuben sammanpressad när den tas ut för att undvika baksug. Skinkorna bör därefter hållas samman ett ögonblick för att undvika att diazepam-lösningen sipprar ut.

Anslagstiden vid rektal administrering är 5 - 15 minuter och durationen är 1 - 3 timmar.

Vanlig indikation och dos

Epileptiska anfall

Barn 5 - 12 kg: 5 mg (1 tub/supp á 5 mg)

Barn över 12 kg: 10 mg (1 tub/supp á 10 mg).

Max 10 mg/dos. Om anfall inte bryts inom 5 min upprepas dosen en gång.

Kramptillstånd (inkl feberkramper)

Om anfall varar mer än 5 min, 0,5 - 0,75 mg/kg, max 10 mg/dos:

Barn under 5 kg: 0,5 mg/kg.

Barn 5 - 12 kg: 5 mg (1 tub/supp á 5 mg)

Barn över 12 kg: 10 mg (1 tub/supp á 10 mg). Max 10 mg/dos.

Övrig information

För barn under 5 kg är Stesolid Rektal Prefill bättre lämpad pga noggrannare dosering och avsaknad av hjälpämnet bensylalkohol. Diazepam rektallösning innehåller bensylalkohol (15 mg/mL). Doser över 99 mg/kg/dag med bensylalkohol har associerats med dödshotande "gasping syndrome".

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-11-09 17:48:48

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-12-19 14:52:41

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3419

ID/spårnummer: 1810

Giltig fr o m: 2016-12-19 14:52:41

Utskriftsdatum: 2016-12-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 alt 10 mg

Referens/Länk

Internetadress Barnläkarföreningen, Epilepsi

<http://snof.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

SLL http://sileped01.ds.sll.se/eped_extra/lokalreferens.html#3419

Sjunet http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3419

Substansspecifika uppgifter

Diazepam, N05BA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCAU9E2EVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-11-09 17:48:48

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-12-19 14:52:41

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3419

ID/spårnummer: 1810

Giltig fr o m: 2016-12-19 14:52:41

Utskriftsdatum: 2016-12-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

