

Diazepam rektalt

(ex Stesolid) 5 alt 10 mg

Denna instruktion gäller för Diazepam Desitin rektallösning (5 och 10 mg), Stesolid suppositorium (5 och 10 mg) samt Stesolid rektallösning (5 och 10 mg).

Administreringsätt

Rektalt: Vid administrering ska barnet ligga framstupa eller på sidan.

För barn under 3 år (alt under 15 kg) ska halva spetsen på tuben föras in.

Den lilla volym lösning som finns kvar i tuben har ingen betydelse för korrekt dosering. Håll tuben sammanpressad när den tas ut för att undvika baksug. Skinkorna bör därefter hållas samman ett ögonblick för att undvika att diazepamlösningen sipprar ut.

Anslagstiden vid rektal administrering är 5 - 15 minuter och durationen är 1 - 3 timmar.

Vanlig indikation och dos

Epileptiska anfall

0,5 - 0,75 mg/kg, max 10 mg/dos.

Barn under 5 kg: använd i första hand Stesolid Rektal Prefill.

Barn 5 - 12 kg: 5 mg (1 klysmå á 5 mg)

Barn över 12 kg: 10 mg (1 klysmå á 10 mg).

Om anfall inte bryts inom 5 min upprepas dosen en gång.

Kramptillstånd (inkl feberkramper)

Om anfall varar mer än (3 -) 5 min: 0,5 - 0,75 mg/kg, max 10 mg/dos.

Barn under 5 kg: använd i första hand Stesolid Rektal Prefill.

Barn 5 - 12 kg: 5 mg (1 klysmå á 5 mg)

Barn över 12 kg: 10 mg (1 klysmå á 10 mg).

Övrig information

För barn under 5 kg är Stesolid Rektal Prefill bättre lämpad pga noggrannare

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-02-01 16:10:14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-02-21 11:28:55

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3419

ID/spårnummer: 1961

Giltig fr o m: 2017-02-21 11:28:55

Utskriftsdatum: 2017-02-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 alt 10 mg

dosering och avsaknad av hjälpämnet bensylalkohol. Diazepam rektallösning innehåller bensylalkohol (15 mg/mL). Doser över 99 mg/kg/dag med bensylalkohol har associerats med dödshotande "gasping syndrome".

Referens/Länk

Internetadress Barnläkarföreningen, Epilepsi

<http://snof.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3419

Substansspecifika uppgifter

Diazepam, N05BA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCAU9E2EVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-02-01 16:10:14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-02-21 11:28:55

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3419

ID/spårnummer: 1961

Giltig fr o m: 2017-02-21 11:28:55

Utskriftsdatum: 2017-02-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

