



Diazepam rektalt

(ex Stesolid) 5 och 10 mg

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Suppositorium 5 och 10 mg (Stesolid)
Rektallösning 5 mg = 2 mg/mL och 10 mg = 4 mg/mL (ex Stesolid)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Rektalt

Vid administrering ska barnet ligga framstupa eller på sidan.

För barn under 3 år (alt. under 15 kg) ska halva spetsen på tuben föras in.

Den lilla volym lösning som finns kvar i tuben har ingen betydelse för korrekt dosering. Håll tuben sammanpressad när den tas ut för att undvika baksug. Skinkorna bör därefter hållas samman ett ögonblick för att undvika att diazepamlösningen sipprar ut.

Anslagstiden vid rektal administrering är 5 - 15 min och effekten varar 1 - 3 tim.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Diazepam (ex Stesolid) (registrerad produkt)

5 mg, Rektallösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller även styrkan 10 mg.

5 mg, Suppositorium

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller även styrkan 10 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Anfall hos nyfödda, Konvulsivt status epileptikus och Epileptiska anfall (inkl feberkramper)

Nyfödda: För dosering, se annan instruktion.
Barn 1 mån - 18 år: 0,2 - 0,5 mg/kg, max 20 mg/DOS

Alternativt (fast dosering)
Barn under 5 kg: använd i första hand Stesolid Rektal Prefill
Barn 5 - 11 kg: 5 mg (1 klysmå å 5 mg)
Barn från 12 kg: 10 mg (1 klysmå å 10 mg)

Om anfallet inte bryts inom 5 min upprepas dosen en gång.

ÖVRIG INFORMATION

För barn under 5 kg är Stesolid Rektal Prefill lämpligare pga noggrannare dosering och avsaknad av hjälpämnet bensylalkohol. Diazepam rektallösning innehåller bensylalkohol (15 mg/mL). Doser över 99 mg/kg/dag med bensylalkohol har associerats med dödshotande "gaspings syndrome".

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkartidningen - Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda

<http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=3825>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Epilepsi

https://lv.se/behandling_epilepsi

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Neuropediatrik Förening - Epilepsi hos barn och ungdomar - Handläggningsstöd

<http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/sextonepilepsi.pdf>



Diazepam rektalt

(ex Stesolid) 5 och 10 mg



LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3419

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-12-18

ePedID: 3419

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-12-18

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-12-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT