



Diazepam rektalt

(ex Stesolid) 5 och 10 mg

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Suppositorium 5 och 10 mg (Stesolid)

Rektallösning 5 mg = 2 mg/mL och 10 mg = 4 mg/mL (ex Stesolid)

Denna instruktion lämpar sig för barn över 5 kg. För mindre barn, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Rektalt

Vid administrering ska barnet ligga framstupa eller på sidan.

För barn under 3 år (alt. under 15 kg) ska halva spetsen på tuben föras in.

Håll tuben sammanpressad när den tas ut för att undvika baksug. Skinkorna bör därefter hållas samman ett ögonblick för att undvika att diazepam-lösningen sipprar ut. Den lilla volym lösning som finns kvar i tuben har ingen betydelse för korrekt dosering.

Anslagstiden är 5 - 15 min och effekten varar 1 - 3 tim.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Diazepam (ex Stesolid) (registrerad produkt)

5 mg, Rektallösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller även styrkan 10 mg.

5 mg, Suppositorium

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller även styrkan 10 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Anfall hos nyfödda, Tidigt konvulsivt status epileptikus och Epileptiska anfall (inkl feberkramper)

Nyfödda: 0,1 - 0,5 mg/kg

Barn 1 mån - 18 år: 0,2 - 0,5 mg/kg, max 20 mg/DOS

Alternativt (fast dosering)

Barn 5 - 11 kg: 5 mg (1 klyσμα á 5 mg)

Barn från 12 kg: 10 mg (1 klyσμα á 10 mg)

Om anfallet inte bryts inom 5 min upprepas dosen en gång.

Sedering inför smärtsamma procedurer

Barn 1 mån - 18 år: 0,2 - 0,4 mg/kg, max 10 mg/DOS

ÖVRIG INFORMATION

Antidot flumazenil (ex Lanexat).

Benzodiazepiner kan ge andningsdepression. Men om status epileptikus inte behandlas är risken för andningskomplikationer ännu högre.

För barn under 5 kg är Stesolid Rektal Prefill lämpligare pga noggrannare dosering och avsaknad av hjälpämnet bensylalkohol. Diazepam rektallösning innehåller bensylalkohol (15 mg/mL). Det är oklart vilka mängder bensylalkohol som är fatalt toxiska, men doser över 99 mg/kg/dygn har gett "gaspig syndrome" hos nyfödda.





Diazepam rektalt

(ex Stesolid) 5 och 10 mg

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkartidningen - Neonatala krampor och epileptiska anfall hos nyfödda

<https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2006/04/neonatala-krampor-och-epileptiska-anfall-hos-nyfodda/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid epilepsi

www.lakemedelsverket.se/behandling_epilepsi

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Neuropediatrisk Förening - Epilepsi hos barn och ungdomar - Handläggningsstöd

<https://snpf.barnlakarforeningen.se/varprogram-2/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3419

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-10-09

ePedID: 3419

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-21

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-10-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT