

Prometazin intravenös inf 1 mg/mL (Phenergan licens)

Kontraindicerat till barn under 2 år. Kontraindicerat att ge intraarteriellt eller subkutant.

En-stegsspädning:	Phenergan	Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9	INF
	25 mg/mL	+ mg/mL	= 1 mg/mL
	2 mL	48 mL	50 mL

Beredningsinstruktion: Späd innehållet från en ampull Phenergan (2 mL) i 48 mL NaCl eller glukos. Utifrån spädning med koncentration 1 mg/mL dras ordinerad dos upp i lämplig spruta.

Administreringsätt

Intravenös infusion: i central infart, för att minska risken för kärlskador.
Administreras under 5 - 10 (- 15) min. Max infusionshastighet 25 mg/min
Klinisk effekt ses efter 3 - 5 min.

Vanlig indikation och dos

Cytostatikaorsakat illamående, svårbehandlat

Barn över 2 år, initialt: 0,1 mg/kg, för att utvärdera effekten.
Vanlig dosering: 0,05 - 0,3 mg/kg x 3. Max 12,5 mg.

Antiemetika i samband med anestesi och operation

Barn över 2 år: 0,25 - 0,5 (- 1) mg/kg x 4 - 6.
Max 12,5 (- 25) mg/dos.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,05 mg/kg			0,5 mL	2,5 mL
0,3 mg/kg			3 mL	15 mL

Hållbarhet preparat:

Phenergan (licensprodukt)

- 25 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

- 1 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Hållbar: Får inte sparas.

Övrig information

Kontraindicerat till barn under 2 år pga risk för andningsdepression. Försiktighet

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-12-15 11:28:54

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-02-07 09:46:42

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3424

ID/spårnummer: 1918

Giltig fr o m: 2017-02-07 09:46:42

Utskriftsdatum: 2017-02-07

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Prometazin intravenös inf 1 mg/mL (Phenergan licens)

till barn över 2 år, använd lägsta effektiva dos.
Försiktighet även för barn med hjärt- och kärlsjukdomar, dehydrering (pga ökad risk för dystoni), benmärgssuppression, mag- och tarmobstruktion, misstänkt Reye's syndrom, nedsatt leverfunktion, astma och magsår.

Kan sänka krampröskeln.

Kan orsaka fotosensivitet, använd därför solskydd i samband med behandling.

Potentierar effekten av opioider.

Intramuskulär administrering rekommenderas i litteraturen för att minska risken för kemisk irritation och vävnadsskada. När det inte är lämpligt är intravenös infusion i central infart ett alternativ.

Phenergan 2,5% innehåller 25 mg/mL prometazin.

Referens/Länk

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Phenergan 2,5%, injektionslösning

Trissel Book on Injectable Drugs

Substansspecifika uppgifter

Promethazine, R06AD02

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-12-15 11:28:54

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-02-07 09:46:42

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3424

ID/spårnummer: 1918

Giltig fr o m: 2017-02-07 09:46:42

Utskriftsdatum: 2017-02-07

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

