



# Prometazin intravenös inf 1 mg/mL

(Phenergan licens)

**Kontraindicerat till barn under 2 år. Kontraindicerat att ge intraarteriellt eller subkutant.**

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning från licenspreparat Phenergan 2,5% = 25 mg/mL

## EN-STEGSSPÄDNING

Phenergan 25 mg/mL 2 mL	+	Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9 mg/mL 48 mL	=	INF <b>1 mg/mL</b> 50 mL
-------------------------------	---	--	---	--------------------------------

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: i central infart, för att minska risken för kärlskador.  
Administreras under 5 - 10 (- 15) min.

Klinisk effekt ses efter 3 - 5 min.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Cytostatikaorsakat illamående, svårbehandlat

Barn över 2 år: Initialt 0,1 mg/kg  
Vanlig dosering: 0,05 - 0,3 (- 1) mg/kg x 3 - 4 (- 6)  
Max 12,5 mg/DOS

### Antiemetika i samband med anestesi och operation

Barn över 2 år: 0,25 - 0,5 (- 1) mg/kg x 1 - 4 (- 6)  
Max 12,5 mg/DOS

## RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,05 mg/kg	-	-	0,5 mL	2,5 mL
0,3 mg/kg	-	-	3 mL	-
1 mg/kg	-	-	10 mL	-
Max 12,5 mg/DOS	-	-	-	12,5 mL

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Pediatric Dosage Handbook

Pediatric Injectable Drugs

PubMed PMID Blanc VF et al. Antiemetic prophylaxis with promethazine or droperidol in paediatric outpatient strabismus surgery.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1989740>

Rekommendation (Grade 2D)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Summary of Product Characteristics (SPC) Phenergan 2,5%, injektionslösning

Trissel Book on Injectable Drugs

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-07-10

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-08-08

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

ePedID: 3424

Versionsnummer, major: 2

Giltig fr o m: 2018-08-08

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**



## Prometazin intravenös inf 1 mg/mL

(Phenergan licens)

### ÖVRIG INFORMATION

Kontraindicerat till barn under 2 år pga risk för andningsdepression. Försiktighet till barn över 2 år, använd lägsta effektiva dos.

Försiktighet även för barn med hjärt- och kärlsjukdomar, dehydrering (pga ökad risk för dystoni), benmärgssuppression, mag- och tarmobstruktion, misstänkt Reye´s syndrom, nedsatt leverfunktion, astma och magsår.

Kan sänka kramptröskeln.

Kan orsaka fotosensitivitet, använd därför solskydd i samband med behandling.

Potentierar effekten av opioider.

Intramuskulär administrering rekommenderas i litteraturen för att minska risken för kemisk irritation och vävnadsskada. När det inte är lämpligt är intravenös infusion i central infart ett alternativ.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Phenergan (licensprodukt)

25 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Efter bruten förpackning:

Får ej sparas pga förväxlingsrisk.

1 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur