



Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL

(Phenergan licens)

Kontraindicerat till barn under 2 år.

Kontraindicerat att ge intraarteriellt eller subkutant.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning från licenspreparat Phenergan 2,5% = 25 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING

| | | | | |
|-----------|---|----------------------------|---|----------------|
| Phenergan | | NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 | | INJ-INF LÖ |
| 25 mg/mL | + | mg/mL | = | 1 mg/mL |
| 2 mL | | 48 mL | | 50 mL |

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion/infusion: i central infart, för att minska risken för kärlskador.

Administreras under 5 - 10 (- 15) min.

Klinisk effekt ses efter 3 - 5 min.

RIMLIG DOS för Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL

| | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|-----------------|------|------|--------|---------|
| 0,05 mg/kg | - | - | 0,5 mL | 2,5 mL |
| 0,25 mg/kg | - | - | 2,5 mL | - |
| 1 mg/kg | - | - | 10 mL | - |
| Max 12,5 mg/DOS | - | - | - | 12,5 mL |

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Cytostatikaorsakat illamående, svårbehandlat

Barn över 2 år: Initialt 0,1 mg/kg

Vanlig dosering: 0,05 - 0,3 (- 1) mg/kg x 3 - 4 (- 6)

Max 12,5 mg/DOS

Antiemetika i samband med anestesi och operation

Barn över 2 år: 0,25 - 0,5 (- 1) mg/kg x 1 - 4 (- 6)

Max 12,5 mg/DOS

ÖVRIG INFORMATION

Kontraindicerat till barn under 2 år pga risk för andningsdepression. Försiktighet till barn över 2 år, använd lägsta effektiva dos.

Försiktighet även för barn med hjärt- och kärlsjukdomar, dehydrering (pga ökad risk för dystoni), benmärgssuppression, mag- och tarmobstruktion, misstänkt Reye's syndrom, nedsatt leverfunktion, astma och magsår.

Kan sänka kramptröskeln.

Kan orsaka fotosensitivitet, använd därför solskydd i samband med behandling.

Potentierar effekten av opioider.

Intramuskulär administrering rekommenderas i litteraturen för att minska risken för kemisk irritation, arteriospasm och vävnadsskada. När det inte är lämpligt är intravenös injektion/infusion i central infart ett alternativ.





Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL

(Phenergan licens)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Phenergan (licensprodukt)

25 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten förpackning får ej sparas pga förväxlingsrisk.

1 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Pediatric Dosage Handbook

Pediatric Injectable Drugs

PubMed PMID Blanc VF et al. Antiemetic prophylaxis with promethazine or droperidol in paediatric outpatient strabismus surgery.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1989740>

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Phenergan 2,5%, injektionslösning

Trissel Book on Injectable Drugs

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-04-25

ePedID: 3424

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-05-02

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-05-02

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT