

Vankomycin oralt 50 mg/mL

(ex Extempore)

En-stegsspädning:	Vankomycin		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
	500 mg	+		=	50 mg/mL
	1 st		10 mL		10 mL

Beredningsinstruktion: Kan beställas som extemporeberedd oral lösning med koncentrationen 50 mg/mL. Beredningsinstruktion är främst avsedd att använda när extemporeberedd lösning inte går att få tag i.

Vid iordningställande på avdelning utgå ifrån Vankomycin pulver till koncentrat till infusionsvätska.

Märk spädning "för oralt bruk" för att undvika förväxling.

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Skyddsinformation saknas i FASS, antibiotika - risk för allergi kan misstänkas

Administreringsätt

Oralt

Enteralt i sond: oral lösning

Vanlig indikation och dos

Enterokolit orsakad av stafylokokker

10 mg/kg x 4, max 2 g/dag. Behandlingstid 10 dagar.

Diarré orsakad av clostridium difficile

10 mg/kg x 4, max 2 g/dag. Behandlingstid 10 dagar.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg	0,2 mL	1 mL	2 mL	10 mL

Hållbarhet preparat:

Vankomycin (extempore - ej lagervara)

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-12-13 11:07:54

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-12-21 11:37:44

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3426

ID/spårnummer: 1826

Giltig fr o m: 2016-12-21 11:37:44

Utskriftsdatum: 2016-12-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Vankomycin oralt 50 mg/mL

(ex Extempore)

- 50 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Om apoteksberedd: öppnad hållbar 4 veckor i kylskåp, efter första uttag 12 tim rumstemperatur alternativt 24 tim i kylskåp. Om iordningställd på avd för oralt bruk: 24 tim i kylskåp.

Övrig information

Det sker ingen absorption av vankomycin i tarmen (dvs obefintlig biotillgänglighet vid oral administrering).

Vankomycinlösning har lågt pH. Ska därför inte administreras samtidigt med andra läkemedel pga risk för utfällning.

Vankomycinkapslar måste sväljas hela då innehållet i kapslarna verkar irriterande på slemhinnan. Därför ska kapslar inte användas vid t.ex. administrering via sond.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Svensk läkemedelsstandard - Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel

<https://lakemedelsverket.se/sls>

NeoFax

Personlig kontakt Apoteket Produktion och Laboratorier, orderservice

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Vancomycin, J01XA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POCNU9NT6VERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-12-13 11:07:54

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-12-21 11:37:44

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3426

ID/spårnummer: 1826

Giltig fr o m: 2016-12-21 11:37:44

Utskriftsdatum: 2016-12-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

