

Vankomycin oralt 50 mg/mL

(ex Extempore) oral lösning

Kan beställas som extemporeberedd oral lösning med koncentrationen 50 mg/mL. Beredningsinstruktion är främst avsedd att använda när extemporeberedd lösning inte går att få tag i.

En-stegsspädning:	Vankomycin 500 mg 1 st	+	Sterilt Vatten 10 mL	=	ORAL LÖSN 50 mg/mL 10 mL
En-stegsspädning:	Vankomycin 1 g 1 st	+	Sterilt Vatten 20 mL	=	ORAL LÖSN 50 mg/mL 20 mL

Beredningsinstruktion: Vid iordningställande på avdelning utgå ifrån Vankomycin pulver till koncentrat till infusionsvätska.
Märk spädning "för oralt bruk" för att undvika förväxling.

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Skyddsinformation saknas i FASS, antibiotika - risk för allergi kan misstänkas

Administreringssätt

Oralt
Enteralt i sond: oral lösning

Vanlig indikation och dos**Enterokolit orsakad av stafylokker**

Barn 0 - 18 år: 10 mg/kg x 4, max 2 g/dag.
Behandlingstid 10 dagar.

Diarré orsakad av clostridium difficile

Barn 0 - 18 år: 10 mg/kg x 4, max 2 g/dag.
Behandlingstid 10 dagar.

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-01-04 09:38:30
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-11 11:21:01
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3426
ID/spårnummer: 1848
Giltig fr o m: 2017-01-11 11:21:01
Utskriftsdatum: 2017-01-11

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Vankomycin oralt 50 mg/mL

(ex Extempore) oral lösning

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg	0,2 mL	1 mL	2 mL	10 mL

Hållbarhet preparat:

Vankomycin (extempore - ej lagervara)

- 50 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Om apoteksberedd: öppnad hållbar 4 veckor i kylskåp, efter första uttag 7 dagar i kylskåp. Om iordningställd på avd för oralt bruk: 24 tim i kylskåp. Märk spädning "för oralt bruk".

Övrig information

Det sker ingen signifikant absorption av vankomycin i tarmen.

Vankomycinlösning har lågt pH (2,5 - 4,5) och kan därför vara irriterande på slemhinnor. Detta kan undvikas genom att administrera läkemedlet via sond.

Vankomycinkapslar måste sväljas hela och ska därför inte användas vid t.ex. administrering via sond. Kapslarna är svåra att öppna och innehållet är gelaktigt och kan sätta igen sonden.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

NeoFax

Personlig kontakt Apoteket Produktion och Laboratorier, orderservice

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Vancomycin, J01XA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POCNU9NT6VERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-01-04 09:38:30

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-11 11:21:01

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3426

ID/spårnummer: 1848

Giltig fr o m: 2017-01-11 11:21:01

Utskriftsdatum: 2017-01-11

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

