

Vankomycin oralt 50 mg/mL

(ex Extempore) oral lösning

Instruktionen gäller för: Alt. 1: Extemporeberedd oral lösning i valfri volym med koncentrationen 50 mg/mL.
Alt. 2: Beredning på avdelning från registrerat preparat. Används i de fall extemporeberedd lösning inte går att få tag i.

En-stegsspädning:	Vankomycin		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
	500 mg	+		=	50 mg/mL
	1 st		10 mL		10 mL

En-stegsspädning:	Vankomycin		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
	1 g	+		=	50 mg/mL
	1 st		20 mL		20 mL

Beredningsinstruktion: Vid iordningställande på avdelning utgå ifrån Vankomycin pulver till koncentrat till infusionsvätska.
Märk spädning "för oralt bruk" för att undvika förväxling.

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner,
Skyddsinformation saknas i FASS, antibiotika - risk för allergi kan misstänkas

Administreringsätt

Oralt
Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos**Enterokolit orsakad av stafylokokker**

Barn 0 - 18 år: 10 mg/kg x 4, max 2 g/dag.
Behandlingstid 10 dagar.

Diarré orsakad av clostridium difficile

Barn 0 - 18 år: 10 mg/kg x 4, max 2 g/dag.
Behandlingstid 10 dagar.

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-08-08 11:09:22
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-16 15:59:44
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3426
ID/spårnummer: 3546
Giltig fr o m: 2017-08-16 15:59:44
Utskriftsdatum: 2017-08-24

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Vankomycin oralt 50 mg/mL

(ex Extempore) oral lösning

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg	0,2 mL	1 mL	2 mL	10 mL

Hållbarhet preparat:

Vankomycin (extempore - ej lagervara)

- 50 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Om apoteksberedd: öppnad hållbar 4 veckor i kylskåp, efter första uttag 7 dagar i kylskåp. Om iordningställd på avd för oralt bruk: 24 tim i kylskåp. Märk spädning "för oralt bruk".

Övrig information

Det sker ingen signifikant absorption av vankomycin i tarmen.

Vankomycinlösning har lågt pH (2,5 - 4,5) och kan därför vara irriterande på slemhinnor. Detta kan undvikas genom att administrera läkemedlet via sond.

Vankomycinkapslar måste sväljas hela och ska därför inte användas vid t.ex. administrering via sond. Kapslarna är svåra att öppna och innehållet är gelaktigt och kan sätta igen sonden.

För egenvård ska preparatet beställas extempore.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

NeoFax

Personlig kontakt Apoteket Produktion och Laboratorier, orderservice

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Vancomycin, J01XA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCNU9NT6VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-08-08 11:09:22

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-16 15:59:44

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3426

ID/spårnummer: 3546

Giltig fr o m: 2017-08-16 15:59:44

Utskriftsdatum: 2017-08-24

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

