

Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning

Överväg dosreduktion om patienten har en leverpåverkan eller är kraftigt dehydrerad.

Vid högre underhållsdosering, vid smärta, ska dygnsdosen reduceras med 25% efter 2 - 3 dygn.

Administreringsätt

Oralt: Vid dagkirurgi ges första dosen paracetamol oralt 2 timmar före operation. Om narkos påbörjats ska paracetamol ges intravenöst, se annan instruktion.
Enteralt i sond: Oral lösning går att ge i sond (även i jejunostomi).

Vanlig indikation och dos

Feber

Nyfödda (från vecka 37): 10 - 15 mg/kg x 3 - 4, max 60 mg/kg/dygn
Barn 1 mån - 11 år: 10 - 15 mg/kg x 4 - 6, max 90 mg/kg/dygn

Smärta (inkl huvudvärk och migrän)

| | Laddningsdos | Underhållsdos | Maxdos |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| GA 26 - 27: | 12 mg/kg | 6 mg/kg x 4 | |
| GA 28 - 32: | 12 - 20 mg/kg | 6 - 15 mg/kg x 2 - 4 | 40 mg/kg/dygn |
| GA över 33: | 20 (- 30) mg/kg | 10 - 20 mg/kg x 3 - 4 | 60 mg/kg/dygn |
| 1 - 2 mån: | 30 mg/kg | 10 - 25 mg/kg x 3 - 4 | 90 mg/kg/dygn |
| Över 2 mån: | 30 - 40 mg/kg | 10 - 25 mg/kg x 3 - 4 (- 6) | 90 mg/kg/dygn Max 4 g/dygn |

GA = Gestationsålder vecka

| Rimlig dos för barn | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 10 mg/kg | 0,42 mL | 2,08 mL | 4,17 mL | 20,8 mL |
| 20 mg/kg | 0,83 mL | 4,17 mL | 8,33 mL | 41,7 mL |
| 30 mg/kg | | 6,25 mL | 12,5 mL | 62,5 mL |

Hållbarhet preparat:

Paracetamol (ex Alvedon/Panodil) (registrerad produkt)

● 24 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Förvaras i rumstemperatur. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-02-16 17:11:55

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-21 13:44:24

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 3428

ID/spårnummer: 4378

Giltig fr o m: 2018-02-21 13:44:24

Utskriftsdatum: 2018-02-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Paracetamol oralt 24 mg/mL

(ex Alvedon) oral lösning

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Dosering av paracetamol till barn

http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/Info_fr_LV_2009-6.pdf

Internetadress Läkemedelsverket, Behandlingsrekommendation Långvarig smärta hos barn och vuxna

<https://lv.se/langvarig-smarta>

Internetadress Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Allegaert K et al. Clinical practice: analgesia in neonates.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19221790>

PubMed PMID Anderson BJ et al. Acetaminophen developmental pharmacokinetics in premature neonates and infants: a pooled population analysis

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12170045>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3428

Substansspecifika uppgifter

Paracetamol, N02BE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POC2U97HOVERT1&UserTypelD=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-02-16 17:11:55

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-21 13:44:24

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3428

ID/spårnummer: 4378

Giltig fr o m: 2018-02-21 13:44:24

Utskriftsdatum: 2018-02-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

