

Ibuprofen oralt

(ex Ipren) tabletter

Instruktionen gäller för: Ibuprofeninnehållande tabletter 200, 400 och 600 mg.

Administreringsätt

Oralt

Maximal analgetisk effekt inträder efter ca 1 - 2 tim.

Vanlig indikation och dos

Smärta och/eller feber (inkl huvudvärk, migrän och postoperativ smärta)

Barn över 3 mån: 4 - 10 mg/kg x 3 - 4

Maxdos till barn 3 - 6 mån: 30 mg/kg/dygn

Maxdos till barn under 60 kg (över 6 mån): 40 mg/kg/dygn

Maxdos till barn över 60 kg (öppenvård): 1,2 g/dygn

Maxdos till barn över 60 kg: 2,4 g/dygn

Alternativt (vanlig fast dosering)

Barn 20 - 40 kg: 200 mg x (1 -) 3 - 4

Barn över 40 kg: 200 - 400 mg x 3 - 4

Premedicinering inför procedur

Barn över 3 mån: 7 mg/kg

Max 600 mg/dos eller 1,2 g/dygn

Alternativt (vanlig fast dosering)

Barn 20 - 40 kg: 200 mg

Barn över 40 kg: 400 mg

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-01-31 08:55:49

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-08 09:26:52

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 3431

ID/spårnummer: 4303

Giltig fr o m: 2018-02-08 09:26:52

Utskriftsdatum: 2018-02-08

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ibuprofen oralt

(ex Ipren) tabletter

Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Barn över 3 mån: (5 -) 7,5 - 15 mg/kg x 3 - 4
Max 60 mg/kg/dygn eller 2,4 g/dygn

Alternativt (vanlig fast dosering)

Barn 20 - 40 kg: 200 mg x 1 - 3

Barn över 40 kg: 400 - 600 mg x 3

Dysmenorré

Barn över 12 år: 400 mg x 1 - 3 vid behov
Max 1,2 g/dygn

Hållbarhet preparat:

Ibuprofen (ex Ipren) (registrerad produkt)

● 200 mg, Filmdragerad tablett

Hållbar: Förvaras i rumstemperatur.

Övrig information

Ibuprofen är kontraindicerat vid ökad blödningsbenägenhet, pågående/återkommande GI-blödningar, gravt nedsatt leverfunktion och NSAID-känslighet.

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion (inkl pyelonefrit), dehydrering och vid varicella zosterinfektion. Ibuprofen ska inte administreras samtidigt med andra nefrotoxiska läkemedel.

Ibuprofen kan förvärra astma och ska därför undvikas vid allvarlig akut astma.

Ibuprofen är det NSAID-preparat med minst biverkningar och mest evidens för säker användning till barn.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket, Behandlingsrekommendation Långvarig smärta hos barn och vuxna

<https://lv.se/langvarig-smarta>

Internetadress Läkemedelsverket: Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård ,(Grade 2A)

<http://eped.se/smartsamma-procedurer-behandling-av-barn-i-halso-och-sjukvard/>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-01-31 08:55:49

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-08 09:26:52

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 3431

ID/spårnummer: 4303

Giltig fr o m: 2018-02-08 09:26:52

Utskriftsdatum: 2018-02-08

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter

Internetadress Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Nonsteroidal anti-inflammatory drug use and the risk of severe skin and soft tissue complications in patients with varicella or zoster disease

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18251759>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3431

Substansspecifika uppgifter

Ibuprofen, M01AE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDF4POEKUAAH3VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-01-31 08:55:49

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-08 09:26:52

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3431

ID/spårnummer: 4303

Giltig fr o m: 2018-02-08 09:26:52

Utskriftsdatum: 2018-02-08

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

