

Ibuprofen oralt 20 mg/mL

(ex Ipren) oral suspension

Administreringsätt

Oralt: Skaka suspensionen före användning.

Enteralt i sond:

1. Skaka suspensionen och dra upp ordinerad volym i lämplig spruta.
2. Späd uppdragen volym med vatten, 1:1 förhållande, för att minska viskositeten och därmed underlätta administrering. Förslagsvis sker spädning i samma spruta.
3. Efter administrering spolas sond enligt lokal instruktion.

Vanlig indikation och dos**Smärta och/eller feber (inkl huvudvärk och migrän)**

Barn från 3 mån: 4 - 10 mg/kg x 3 - 4, max 40 mg/kg/dygn eller 2,4 g/dygn.

Premedicinering inför procedur

Från 3 mån: 7 mg/kg oralt eller rektalt, max 600 mg/dos.

Maximal analgetisk effekt inträder efter ca 1 - 2 tim.

Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Från 3 mån: (5 -) 7,5 - 15 mg/kg x 3 - 4, max 60 mg/kg/dygn eller max 2,4 g/dygn.

Postoperativ smärtlindring

Från 3 mån: 4 (- 10) mg/kg x 4

Dysmenorré

Barn över 12 år: 400 mg x 1 - 3 vid behov.

Rimlig dos för barn

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg		1,25 mL	2,5 mL	12,5 mL
7 mg/kg		1,75 mL	3,5 mL	17,5 mL

Hållbarhet preparat:

Ibuprofen (Ipren, Brufen m fl) (registrerad produkt)

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-09-01 10:32:31

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-01 10:32:26

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3432

ID/spårnummer: 3618

Giltig fr o m: 2017-09-01 10:32:26

Utskriftsdatum: 2017-09-01

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ibuprofen oralt 20 mg/mL

(ex Ipren) oral suspension

- 20 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Öppnad flaska ska användas inom 12 månader (Brufen, info saknas för övriga suspensioner med denna konc)

Övrig information

Ibuprofen är kontraindicerat vid ökad blödningsbenägenhet, pågående/återkommande GI-blödningar, gravt nedsatt leverfunktion och NSAID-känslighet.

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion (inkl pyelonefrit), dehydrerade barn och vid varicella zosterinfektion. Ibuprofen ska inte administreras samtidigt med andra nefrotoxiska läkemedel.

Ibuprofen kan förvärra astma och ska därför undvikas vid allvarlig akut astma.

Ibuprofen är det NSAID-preparat med minst biverkningar och mest evidens för säker användning hos barn.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket: Smärtsamma procedurer - behandling av barn i hälso- och sjukvård ,(Grade 2A)

<http://eped.se/smartsamma-procedurer-behandling-av-barn-i-halso-och-sjukvard/>

Internetadress Smärtbehandlingsriktlinjer för Barn vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Nonsteroidal anti-inflammatory drug use and the risk of severe skin and soft tissue complications in patients with varicella or zoster disease

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18251759>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3432

Substansspecifika uppgifter

Ibuprofen, M01AE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POEKUAAH3VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-09-01 10:32:31

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-01 10:32:26

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3432

ID/spårnummer: 3618

Giltig fr o m: 2017-09-01 10:32:26

Utskriftsdatum: 2017-09-01

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

