

Ibuprofen oralt 20 mg/mL

(ex Ipren) oral suspension

Administreringsätt

Skaka suspensionen före användning.

Oralt

Enteralt i sond: Uppdragen volym kan spädas med vatten, 1:1 förhållande, för att minska viskositeten och därmed underlätta administrering.

Maximal analgetisk effekt inträder efter ca 1 - 2 tim.

Vanlig indikation och dos**Smärta och/eller feber (inkl huvudvärk, migrän och postoperativ smärta)**

Barn över 3 mån: 4 - 10 mg/kg x 3 - 4

Maxdos till barn 3 - 6 mån: 30 mg/kg/dygn

Maxdos till barn under 60 kg (över 6 mån): 40 mg/kg/dygn

Maxdos till barn över 60 kg (öppenvård): 1,2 g/dygn

Maxdos till barn över 60 kg: 2,4 g/dygn

Premedicinering inför procedur

Barn över 3 mån: 7 mg/kg

Max 600 mg/dos eller 1,2 g/dygn

Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Barn över 3 mån: (5 -) 7,5 - 15 mg/kg x 3 - 4

Max 60 mg/kg/dygn eller 2,4 g/dygn

Dysmenorré

Barn över 12 år: 400 mg x 1 - 3 vid behov

Max 1,2 g/dygn

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
4 mg/kg		1 mL	2 mL	10 mL
7 mg/kg		1,75 mL	3,5 mL	17,5 mL

Hållbarhet preparat:

Ibuprofen (ex Ipren) (registrerad produkt)

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-02-01 10:06:31

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-08 09:31:18

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 3432

ID/spårnummer: 4304

Giltig fr o m: 2018-02-08 09:31:18

Utskriftsdatum: 2018-02-08

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ibuprofen oralt 20 mg/mL

(ex Ipren) oral suspension

- 20 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Öppnad flaska ska användas inom 12 månader (Brufen, info saknas för övriga suspensioner med denna konc)

Övrig information

Ibuprofen är kontraindicerat vid ökad blödningsbenägenhet, pågående/återkommande GI-blödningar, gravt nedsatt leverfunktion och NSAID-känslighet.

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion (inkl pyelonefrit), dehydrering och vid varicella zosterinfektion. Ibuprofen ska inte administreras samtidigt med andra nefrotoxiska läkemedel.

Ibuprofen kan förvärra astma och ska därför undvikas vid allvarlig akut astma.

Ibuprofen är det NSAID-preparat med minst biverkningar och mest evidens för säker användning till barn.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket: Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård ,(Grade 2A)

<http://eped.se/smartsamma-procedurer-behandling-av-barn-i-halso-och-sjukvard/>

Internetadress Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Nonsteroidal anti-inflammatory drug use and the risk of severe skin and soft tissue complications in patients with varicella or zoster disease

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18251759>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3432

Substansspecifika uppgifter

Ibuprofen, M01AE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POEKUAAH3VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-02-01 10:06:31

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-08 09:31:18

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3432

ID/spårnummer: 4304

Giltig fr o m: 2018-02-08 09:31:18

Utskriftsdatum: 2018-02-08

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ibuprofen oralt 20 mg/mL
(ex Ipren) oral suspension

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-02-01 10:06:31
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-08 09:31:18
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3432
ID/spårnummer: 4304
Giltig fr o m: 2018-02-08 09:31:18
Utskriftsdatum: 2018-02-08

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

