

# Diazepam rektalt 5 mg/mL

## (Stesolid Rektal Prefill)

---

### Administreringsätt

Rektalt: Vid administrering ska barnet ligga framstupa eller på sidan.

Spets som ska sättas på sprutan medföljer förpackning. Tryck upp sprutkolven tills volymmärkning för ordinerad dos kvarstår i sprutan, överskottet kasseras.

För barn under 3 år ska halva sprutan föras in.

Efter administrering bör skinkorna hållas samman en stund för att undvika att lösningen sipprar ut.

Överskottet i sprutspetsen har ingen betydelse för korrekt dosering.

---

### Vanlig indikation och dos

#### Status epilepticus

Barn under 5 kg: 0,5 mg/kg (0,1 mL/kg).

Barn 5 - 12 kg: 5 mg (motsvarar 1 Prefillspruta)

Barn över 12 kg: 10 mg(motsvarar 2 Prefillsprutor)

Max 10 mg/dos.

#### Kramptillstånd (inkl feberkramper)

Om anfall varar mer än 5 min:

Barn under 5 kg: 0,5 mg/kg (0,1 mL/kg).

Barn 5 - 12 kg: 5 mg (motsvarar 1 Prefillspruta)

Barn över 12 kg: 10 mg(motsvarar 2 Prefillsprutor)

Max 10 mg/dos

---

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL		

---

### Hållbarhet preparat:

Stesolid Rektal Prefill (registrerad produkt)

5 mg/mL, Rektallösning

Hållbar: Förvaras vid högst 25°C. Kasseras efter användning.

---

### Övrig information

Prefillsprutan är praktiskt lämpad att använda till barn från 3 kg, baserat på

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-12-22 11:36:02

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-17 14:30:43

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3433

ID/spårnummer: 1859

Giltig fr o m: 2017-01-17 14:30:43

Utskriftsdatum: 2017-01-19

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill)

sprutans utformning.

För barn över 5 kg är diazepam suppositorier eller rektallösning ett alternativ, se annan instruktion.

Prefillen innehåller inte bensylalkohol eller bensoesyra men 80 mg etanol per mL diazepam.

Prefillen är dyrare än rektallösning.

---

### Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Barnläkarföreningen, Epilepsi

<http://snpf.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2C)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3433](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3433)

---

### Substansspecifika uppgifter

Diazepam, N05BA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POCAU9E2EVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-12-22 11:36:02

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-17 14:30:43

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3433

ID/spårnummer: 1859

Giltig fr o m: 2017-01-17 14:30:43

Utskriftsdatum: 2017-01-19

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

