



## Diazepam rektalt 5 mg/mL

(Stesolid Rektal Prefill) rektallösning

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Rektalt: Vid administrering ska barnet ligga framstupa eller på sidan.

Spets som ska sättas på sprutan medföljer förpackning. Tryck upp sprutkolven tills volymmarkering för ordinerad dos kvarstår i sprutan, överskottet kasseras.

För barn under 3 år ska halva sprutan föras in.

Efter administrering bör skinkorna hållas samman en stund för att undvika att lösningen sipprar ut.

Överskottet i sprutspetsen har ingen betydelse för korrekt dosering.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

**Stesolid Rektal Prefill (registrerad produkt)**

5 mg/mL, Rektallösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Kasseras efter användning.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

**Anfall hos nyfödda,  
Konvulsivt status epileptikus och  
Epileptiska anfall (inkl feberkramper)**

Nyfödda: 0,1 - 0,5 mg/kg (motsvarar 0,02 - 0,1 mL/kg)

Barn 1 mån - 18 år: 0,2 - 0,5 mg/kg (motsvarar 0,04 - 0,1 mL/kg)

Max 20 mg/DOS

Alternativt (fast dosering)

Barn 5 - 11 kg: 5 mg (motsvarar 0,5 Prefillspruta)

Barn från 12 kg: 10 mg (motsvarar 1 Prefillspruta)

Om anfallet inte bryts inom 5 min upprepas dosen en gång.

### ÖVRIG INFORMATION

Prefillsprutan är praktiskt lämpad att använda till barn från 3 kg, baserat på sprutans utformning.

För barn över 5 kg är diazepam suppositorier eller rektallösning ett alternativ, se annan instruktion.

Prefillen innehåller inte bensylalkohol, vilket övriga diazepam rektallösningar gör.

Prefillen är dyrare än vanlig rektallösning.



## Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning



### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkartidningen - Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda

<http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=3825>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Epilepsi

[https://lv.se/behandling\\_epilepsi](https://lv.se/behandling_epilepsi)

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Neuropediatrik Förening - Epilepsi hos barn och ungdomar - Handläggningsstöd

<http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/sextonepilepsi.pdf>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3433](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3433)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-12-18

ePedID: 3433

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-12-18

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-12-18

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**