



## Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Diazepam rektallösning 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill)

Denna instruktion lämpar sig för doser under 5 mg. För högre doser, se annan instruktion.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Rektalt

Vid administrering ska barnet ligga framstupa eller på sidan.  
För barn under 3 år (alt. under 15 kg) ska halva sprutan föras in.

Spets som ska sättas på sprutan medföljer förpackning. Tryck upp sprutkolven tills volymmarkering för ordinerad dos kvarstår i sprutan.

Efter administrering bör skinkorna hållas samman en stund för att undvika att lösningen sipprar ut.

Den lilla volym lösning som finns kvar i sprutspetsen har ingen betydelse för korrekt dosering, överskottet ska kasseras.

Anslagstiden är 5 - 15 min och effekten varar 1 - 3 tim.

### RIMLIG DOS för Diazepam rektalt 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,2 mg/kg	-	0,2 mL	0,4 mL	-
0,5 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	-

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

**Stesolid Rektal Prefill (registrerad produkt)**

5 mg/mL, Rektallösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Kasseras efter användning.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

**Anfall hos nyfödda**

**Tidigt konvulsivt status epileptikus**

**Epileptiska anfall (inkl feberkramper)**

Nyfödda: 0,1 - 0,5 mg/kg

Barn 1 mån - 18 år: 0,2 - 0,5 mg/kg, max 20 mg/DOS

Om anfallet inte bryts inom 5 min upprepas dosen en gång.

**Sedering inför smärtsamma procedurer**

Barn 1 mån - 18 år: 0,2 - 0,4 mg/kg, max 10 mg/DOS

### ÖVRIG INFORMATION

Antidot flumazenil (ex Lanexat).

Benzodiazepiner kan ge andningsdepression. Men om status epileptikus inte behandlas är risken för andningskomplikationer ännu högre.

Prefillsprutan är praktiskt lämpad att använda till barn från 3 kg, baserat på sprutans utformning. För doser från 5 mg är diazepam suppositorier eller vanlig rektallösning ett alternativ, se annan instruktion.

Prefillen innehåller inte bensylalkohol, vilket övriga diazepam rektallösningar gör.

Prefillen är dyrare än vanlig rektallösning.





## Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkartidningen - Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda

<https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2006/04/neonatala-kramper-och-epileptiska-anfall-hos-nyfodda/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

[www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur](http://www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur)

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid epilepsi

[www.lakemedelsverket.se/behandling\\_epilepsi](http://www.lakemedelsverket.se/behandling_epilepsi)

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Neuropediatrisk Förening - Epilepsi hos barn och ungdomar - Handläggningsstöd

<https://snpf.barnlakarforeningen.se/varprogram-2/>

---

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3433](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3433)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-11-23

ePedID: 3433

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-11-23

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-11-23

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**