



Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Rektallösning 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill)

Denna instruktion lämpar sig för doser under 5 mg. För högre doser, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Rektalt

Vid administrering ska barnet ligga framstupa eller på sidan.
För barn under 3 år (alt. under 15 kg) ska halva sprutan föras in.

Spets som ska sättas på sprutan medföljer förpackningen. Tryck upp sprutkolven tills volymmarkering för ordinerad dos kvarstår i sprutan. Efter administrering bör skinkorna hållas samman en stund för att undvika att lösningen sipprar ut.

Den lilla volym lösning som finns kvar i sprutspetsen har ingen betydelse för korrekt dosering, överskottet ska kasseras.

Anslagstiden är 5 - 15 min och effekten varar 1 - 3 tim.

RIMLIG DOS för Diazepam rektalt 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,2 mg/kg	-	0,2 mL	0,4 mL	-
0,5 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Stesolid Rektal Prefill (registrerad produkt)

5 mg/mL, Rektallösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Kasseras efter användning.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Neonatala kramper

Nyfödda: 0,1 - 0,5 mg/kg

Vid utebliven effekt:

På sjukhus: övergång till intravenös behandling, alternativt intramuskulär om infart saknas, enligt lokal riktlinje

Utanför sjukhus (hemmabruk): på individuell ordination för vissa patienter kan en andra dos ges

Pågående kramp inkl status epileptikus

Barn 1 mån - 18 år: 0,2 - 0,5 mg/kg, max 20 mg/DOS

Vid utebliven effekt:

På sjukhus: övergång till intravenös behandling, alternativt intramuskulär om infart saknas, enligt lokal riktlinje

Utanför sjukhus (hemmabruk): på individuell ordination för vissa patienter kan en andra dos ges

Sedering inför procedur

Barn 1 mån - 18 år: 0,2 - 0,4 mg/kg, max 10 mg/DOS

ÖVRIG INFORMATION

Antidot flumazenil (ex Lanexat).

Bensodiazepiner kan ge andningsdepression, men om status epileptikus inte behandlas är risken för andningskomplikationer ännu högre.

Prefillsprutan är praktiskt lämpad att använda till barn från 3 kg, baserat på sprutans utformning. För doser från 5 mg är diazepam suppositorier eller vanlig rektallösning ett alternativ, se annan instruktion.

Stesolid Rektal Prefill innehåller inte bensylalkohol, vilket övriga rektallösningar med diazepam gör. Stesolid Rektal Prefill är dyrare än vanlig rektallösning. Sedan 1 okt 2020 ingår den inte heller i förmånen (på företagets begäran).





Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkartidningen - Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda

<https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2006/04/neonatala-kramper-och-epileptiska-anfall-hos-nyfodda/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid epilepsi

www.lakemedelsverket.se/behandling-epilepsi

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Neuropediatrik Förening - Epilepsi hos barn och ungdomar - Handläggningsstöd

<https://snpf.barnlakarforeningen.se/varprogram-2/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3433

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-09-08

ePedID: 3433

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-09-14

Versionsnummer, major: 7

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-09-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT