

# Diazepam oralt

## (ex Stesolid) tabletter

Denna instruktion gäller för diazepam tabletter 2, 5 och 10 mg.

---

### Administreringsätt

Oralt: Anslagstiden vid oral administrering är 15 - 30 minuter och durationen är 1 - 3 timmar.

---

### Vanlig indikation och dos

#### Sedering vid procedursmärta

Barn: 0,2 - 0,4 mg/kg, max 10 mg.

#### Oro (undantagsfall)

Barn: 0,025 - 0,1 mg/kg, max 10 mg.

---

### Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/.htm>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Substansspecifika uppgifter

Diazepam, N05BA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POCAU9E2EVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-12-22 14:52:33

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-17 14:33:31

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3434

ID/spårnummer: 1860

Giltig fr o m: 2017-01-17 14:33:31

Utskriftsdatum: 2017-01-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

