



Diazepam oralt

(ex Stesolid) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 2, 5 och 10 mg (ex Stesolid)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Vid sväljsvårigheter kan tablettarna delas och/eller slamas upp i 10 mL vatten inför oral administrering. I produktresumén för Diazepam Pilum anges att tablettens kan delas i två lika stora doser. För övriga läkemedel saknas denna information.

Enteralt i sond: Tablettarna kan krossas och slamas upp i 10 mL vatten och administreras i nasogastrisk sond (från 8 Fr).

Anslagstiden är 15 - 30 min och effekten varar 1 - 3 tim.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Diazepam (registrerad produkt)

2 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller samtliga styrkor och fabrikat.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Sedering inför procedur

Barn 6 mån - 18 år: 0,2 - 0,4 mg/kg, max 10 mg/DOS

ÖVRIG INFORMATION

Antidot flumazenil (ex Lanexat).

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-03-18

ePedID: 3434

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-03-23

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-03-23

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT