



## Ibuprofen rektalt

(ex Ipren) suppositorier

**Försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion, gastroenterit och långvarig feber.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Suppositorium 60 mg (Ipren)  
Licenspreparat suppositorium 125 mg (ex Nurofen Junior).

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Rektalt: Suppositorier ska inte delas

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Ibuprofen (ex Ipren) (registrerad produkt)

60 mg, Suppositorium

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Gäller även för suppositorium 125 mg.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Smärta och/eller feber (inkl postoperativ smärtlindring)

Barn från 3 mån och 7 kg: 4 - 10 mg/kg x 3 - 4

Alternativt (fast dosering)

Barn från 7 kg: 60 mg x 3 - 4

Barn 15 - 24 kg: 120 - 125 mg x 3 - 4

Maxdos

Barn 3 - 5 mån: 30 mg/kg/dygn

Barn från 6 mån och under 60 kg: 40 mg/kg/dygn

#### Premedicinering inför procedur

Barn från 3 mån och 7 kg: 7 mg/kg, max 600 mg/DOS

Maximal analgetisk effekt inträder efter ca 1 - 2 tim.

### ÖVRIG INFORMATION

Ibuprofen är kontraindicerat vid ökad blödningsbenägenhet, pågående/återkommande GI-blödningar, gravt nedsatt leverfunktion och NSAID-känslighet.

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion (inkl pyelonefrit), dehydrerade barn och vid varicella zosterinfektion. Ibuprofen ska inte administreras samtidigt med andra nefrotoxiska läkemedel. Ibuprofen kan förvärra astma och ska därför undvikas vid allvarlig akut astma.

Ibuprofen är det NSAID-preparat med minst biverkningar och mest evidens för säker användning hos barn.





## Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

<https://lv.se/procedursmarta-barn>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna

<https://lv.se/langvarig-smarta>

PubMed PMID Nonsteroidal anti-inflammatory drug use and the risk of severe skin and soft tissue complications in patients with varicella or zoster disease

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18251759>

Rekommendation ,(Grade 1B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-04-09

ePedID: 3435

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-04-10

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-04-10

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**