



## Oxikodon oralt 1 mg/mL

(OxyNorm) oral lösning

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

### ÖVRIG INFORMATION

Administrering och dosering skall individualiseras, hänsyn bör tas till smärtans natur och svårighetsgrad samt patientens allmäntillstånd.

Vid övergång från intravenös till peroral administrering bör dygnsdosen höjas 1,3 - 2 gånger pga lägre biotillgänglighet.

Vid utsättande efter 6 dygns opioidbehandling bör dosen successivt reduceras. Initial dosminskning med 20 - 40 %, därefter gradvis med 10 - 20 % under ca 5 dygn.

Oxikodon är en opioid med effekt även på kappa-receptorn. Kappa-receptorer finns perifert i bukorganen och oxikodon kan ha en fördel vid behandling av visceral smärta jämfört med övriga opioider.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Oxikodon (ex OxyNorm) (registrerad produkt)

1 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30°C. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Smärta

Nyfödda: 0,1 - 0,2 mg/kg x 3

Barn 1 mån - 18 år: 0,1 - 0,2 mg/kg x 2 - 3 (- 4)

### RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress SFBABI - Seding vid intensivvård av barn

<https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/intensivvard/seding-vid-intensivvard-av-barn/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3445](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3445)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-08-21

ePedID: 3445

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-08-21

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-08-21

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**