

Flukloxacillin oralt (ex Heracillin)

Denna instruktion gäller för flukloxacillinnehållande tabletter 125 mg, 500 mg, 750 mg respektive 1 g.

Arbetsmiljö Allergisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Administreringsätt Oralt: Flukloxacillin har bäst effekt om doserna tas mellan måltider (minst 30 minuter före måltid).

Vanlig indikation och dos

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för flukloxacillin, fr.a. infektioner i lungor, hud och/eller mjukdelar

Nyfödda:

Dag 0 - 7: 25 mg/kg x 2

Dag 8 - 21: 25 mg/kg x 3

Dag 22 - 28: 25 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 10 - 17 mg/kg x 3

Barn över 2 år: dosen kan ökas till 20 - 33 mg/kg x 3, max 1 g x 3, vid infektioner i leder och skelett samt vid allvarliga infektioner i lungor, hud eller mjukdelar.

Uppföljande peroral behandling av skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit, spondylodiskit orsakade av Staphylococcus aureus

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4, max 4 (- 6) g/dygn

Total rekommenderad behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling, i okomplicerade fall: 4 veckor

Luftvägsinfektion vid Cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4 alt 33 mg/kg x 3, max 4,5 g/dygn

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-03-15 15:30:53
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-03-16 11:03:17
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3455
ID/spårnummer: 2995
Giltig fr o m: 2017-03-16 11:03:17
Utskriftsdatum: 2017-03-16

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Flukloxacillin oralt

(ex Heracillin)

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3455

Substansspecifika uppgifter

Flucloxacillin, J01CF05

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POE1U9VI9VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-03-15 15:30:53
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-03-16 11:03:17
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3455
ID/spårnummer: 2995
Giltig fr o m: 2017-03-16 11:03:17
Utskriftsdatum: 2017-03-16

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

