

## Serum mot huggormsgift intravenös inf (Viper Venom Antiserum European, Licens) häst

Vid osäkerhet eller behov av ytterligare info, ring Giftinformationscentralen 08-736 03 84.

### Tillsatser som ger Serum mot huggormsgift intravenös inf

Hästserum mot huggormsgift 1 g IV	1 st
Natriumklorid 9 mg/mL IV	200 mL

Beredningsinstruktion: 1 st ampull späds med 200 mL NaCl 9 mg/mL. 1 ampull innehåller 10 mL injektionslösning (motsvarande 1 g antigenbindande fragment).

Hela volymen ska ges till patienten oavsett ålder och vikt.

### Administreringsätt

Intravenös infusion: 60 min

### Vanlig indikation och dos

#### Huggormsbett, serumbehandling

1 g x 1

Motsvarar 1 st ampull á 1 g antigenbindande fragment.

Dosen upprepas vid behov om allvarliga symtom återkommer efter initial förbättring av dos 1 eller om utebliven förbättring av dos 1 inom 2 timmar.

Ring GIC för diskussion om indikation för en andra dos.

För mer information om klinisk bild, utredningar mm, se lokalt PM.

### Hållbarhet preparat:

Hästserum mot huggormsgift (licensprodukt)

● 1 g, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C) i originalförpackningen, ljuskänsligt.

### Övrig information

Barn bör observeras i minst 24 timmar efter inkomst till sjukhus då reaktionerna efter huggormsbett kan variera kraftigt. Tecken på systempåverkan uppkommer

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-03-22 14:13:11

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-04-24 11:38:02

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4458

ID/spårnummer: 3154

Giltig fr o m: 2017-04-24 11:38:02

Utskriftsdatum: 2017-04-24

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Serum mot huggormsgift intravenös inf (Viper Venom Antiserum European, Licens) häst

i allmänhet under de närmaste timmarna efter bettet. Naturalförloppet för maximal utbredning av lokalreaktionen är 48 - 72 timmar.

Vid serumtillförsel minskar allmänsymtomen snabbt. Cirkulationspåverkan viker inom 1 timme och GI-symtom inom 2 timmar. Tidig tillförsel av serum är det enda som effektivt kan påverka lokalreaktionens utbredning.

Akuta och fördröjda allergiska reaktioner har rapporterats i ca 10% av fallen behandlade med detta hästserum från Zagreb.

Enligt SPC ska hästserum ges intramuskulärt men enligt Giftinformationscentralen ska serumet ges intravenöst under 60 min.

10 mL injektionslösning innehåller 1 g antigenbindande fragment 2-typ (100 mg/mL).

---

### Referens/Länk

Internetadress Giftinformationscentralen, Huggormsbett

<https://giftinformation.se/lakare/substanser/huggorm/>

Rekommendation (Grade 2D)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Summary of Product Characteristics (SPC) European Viper Venom Antiserum

---

### Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjonet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4458](http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4458)

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-03-22 14:13:11  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-04-24 11:38:02  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4458  
ID/spårnummer: 3154  
Giltig fr o m: 2017-04-24 11:38:02  
Utskriftsdatum: 2017-04-24

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

