

Abatacept intravenös inf (Orencia)

Dos ordineras utifrån koncentration 25 mg/mL som sedan tillsätts till spädningsvätska. Iordningställande sker i 2 STEG, se beredningsinstruktion.

Ska spädas vidare	Abatacept (Orencia) 250 mg 1 st	+	NaCl 9 mg/mL alt sterilt vatten 10 mL	=	SKA SPÄDAS VIDARE 25 mg/mL 10 mL
--------------------------	---------------------------------------	---	--	---	--

Beredningsinstruktion: STEG 1:
Lös upp pulvret i injektionsflaskan med 10 mL sterilt vatten.

Använd den silikonfria engångssprutan som medföljer förpackningen och en 18 - 21 gauge nål.

Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret för att minimera skumbildning. Skaka inte. Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd den inte om den är grumlig.

Individuell spädning

Beredningsinstruktion: STEG 2:
Tillför långsamt ordinerad volym (från en eller fler injektionsflaskor) till NaCl 9 mg/mL 100 mL infusionspåse/infusionsflaska.

Använd den silikonfria engångssprutan som medföljer förpackningen.

Exempel: Volym av Abatacept (Orencia) 25 mg/mL som ger önskad dos vid spädning

Kroppsvikt	Volym vid dos 10 mL
20 kg	8 mL till 100 mL
30 kg	12 mL till 100 mL
50 kg	20 mL till 100 mL

Arbetsmiljö Allergisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringsätt

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-08-14 16:48:00
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-05 10:17:27
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4463
ID/spårnummer: 3638
Giltig fr o m: 2017-09-05 10:17:27
Utskriftsdatum: 2017-09-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Abatacept intravenös inf (Orencia)

Intravenös infusion: 30 min

Företaget rekommenderar användning av infusionsaggregat med inbyggt filter, se Övrigt.

Läkemedlet ska ges i separat lumen, då blandbarhetsstudier saknas.

Vanlig indikation och dos

Juvenil idiopatisk artrit

Barn över 6 år och under 75 kg: 10 mg/kg

Barn 75 - 100 kg: 750 mg, max 1 000 mg

Dosen upprepas efter 2 och 4 veckor. Därefter ges Orencia var 4:e vecka.

Hållbarhet preparat:

Abatacept (Orencia) (från registrerad produkt)

- 250 mg, Pulver till koncentrat för injektions-/infusionsvätska, lösning
Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C). Förvaras i originalförpackningen.
Ljuskänsligt.

- 25 mg/mL, Stamlösning
Hållbar: Hållbar 24 tim kylskåp, 12 tim rumstemperatur.

Övrig information

Kontraindicerat att ge i samband med allvarliga okontrollerade infektioner (t.ex. sepsis).

Silikonfria sprutor ska användas vid administrering och beredning då läkemedlet adsorberar till silikonolja.

Tillverkarna rekommenderar användning av infusionsaggregat med inbyggt filter med porstorlek 0,2 - 1,2 mikrometer och låg proteinbindningsgrad. Detta för att skydda patienten mot partiklar som kan ha bildats t.ex. i samband med oavsiktlig användning av sprutor innehållande silikonolja.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Krayukhina E et al. Effects of syringe material and silicone oil lubrication on the stability of pharmaceutical proteins.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25256796>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-08-14 16:48:00

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-05 10:17:27

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4463

ID/spårnummer: 3638

Giltig fr o m: 2017-09-05 10:17:27

Utskriftsdatum: 2017-09-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Abatacept intravenös inf **(Orencia)**

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Abatacept, L04AA24

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-08-14 16:48:00
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-05 10:17:27
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4463
ID/spårnummer: 3638
Giltig fr o m: 2017-09-05 10:17:27
Utskriftsdatum: 2017-09-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

