



Linezolid oralt 600 mg

(ex Zyvoxid) tablett

Till följd av tabletternas styrka är dessa endast lämpliga att ge till barn från 60 kg. Tabletterna är inte delbara. För mindre barn finns linezolid oral suspension 20 mg/mL, se annan instruktion.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: kan tas med eller utan mat.

Enteralt i sond: användning av linezolid oral suspension 20 mg/mL rekommenderas.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Linezolid (registrerad produkt)

600 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för linezolid, exempelvis med vankomycinresistenta kocker

Barn från 60 kg: 600 mg x 2

Blodstatus bör kontrolleras minst 1 gång per vecka.

Behandlingstid: vanligen 10 - 14 dagar

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket - Behandlingsrekommendationer, Sjukhusförvärd
pneumoni

<https://lv.se/pneumoni>

Micromedex

NeoFax

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-09-04

ePedID: 4468

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-09-04

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-09-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT