

# Linezolid oralt 20 mg/mL

## (Zyvoxid) oral suspension

**Instruktionen gäller för:** Alt. 1: Färdigspädd oral suspension Zyvoxid 20 mg/mL.  
Alt. 2: Pulver till oral suspension Zyvoxid 20 mg/mL som späds på vårdenheten.

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver ska finnas för vårdenheten om alt. 2 används.

<b>En-stegsspädning:</b>	Linezolid (ex Zyvoxid)		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
Alt. 2	1 flaska	+		=	<b>20 mg/mL</b>
	1 st		123 mL		150 mL

**Beredningsinstruktion:** Vänd flaskan några gånger innan vattnet tillsätts för att lösgöra granulatet. Tillsätt vattnet uppdelat i 2 jämnstora omgångar. Skaka flaskan kraftigt efter varje tillsats.

Pulvret bidrar med volym vilket gör att slutvolymen blir 150 mL.

**Arbetsmiljö** Allergirisk, hantera enligt lokal instruktion, -

### Administreringsätt

Oralt: Flaskan ska vändas försiktigt några gånger före varje användning. Skaka inte.  
Enteralt i sond

### Vanlig indikation och dos

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-10-17 11:38:43  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-10-17 11:38:37  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4469  
ID/spårnummer: 3777  
Giltig fr o m: 2017-10-17 11:38:37  
Utskriftsdatum: 2017-10-18

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Linezolid oralt 20 mg/mL

## (Zyvoxid) oral suspension

### Bakteriell infektion med bakterier känsliga för linezolid, exempelvis med vankomycinresistenta kocker

Nyfödda

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 10 mg/kg x 2

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 10 mg/kg x 3

Dag 8 - 28:

Oavsett gestationsålder vid födsel: 10 mg/kg x 3

Barn 1 mån - 12 år: 10 mg/kg x 3, max 600 mg/dos

Barn från 12 år: 600 mg x 2

Behandlingstid: vanligen 10 - 14 dagar

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	25 mL

### Hållbarhet preparat:

Linezolid (ex Zyvoxid) (registrerad produkt)

- 1 flaska, Granulat till oral suspension

Hållbar: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

- 20 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Färdigberedd suspension är hållbar i 3 veckor i rumstemperatur.

Förvaras i ytterkartong, ljuskänslig.

### Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnf/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket, Behandlingsrekommendation Sjukhusförvärd pneumoni

<https://lv.se/pneumoni>

Internetadress Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om Neonatal Sepsis

<https://lv.se/neonatal-sepsis>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-10-17 11:38:43

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-10-17 11:38:37

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4469

ID/spårnummer: 3777

Giltig fr o m: 2017-10-17 11:38:37

Utskriftsdatum: 2017-10-18

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension

Micromedex

NeoFax

Rekommendation ,(Grade 2D)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

## Substansspecifika uppgifter

linezolid, J01XX08

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POIDUCD6SVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-10-17 11:38:43  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-10-17 11:38:37  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4469  
ID/spårnummer: 3777  
Giltig fr o m: 2017-10-17 11:38:37  
Utskriftsdatum: 2017-10-18

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

