

Erytromycin oralt

(Abboticin Novum, Ery-Max)

Instruktionen gäller för: Kapslar 250 mg, tabletter 500 mg samt dospåse med granulat till oral suspension 200 mg.

Arbetsmiljö Allergirisk, hantera enligt lokal instruktion, Erytromycinlaktobionat kan vid intag, hudkontakt eller inandning av damm i sällsynta fall orsaka allergiska reaktioner

Administreringsätt

Oralt:
Kapslarna kan öppnas och kornen sväljas för sig. Kornen får inte tuggas eller krossas.

Granulatet i dospåsen ska röras ut med 20 - 30 mL vatten.

Dosen bör intas omedelbart före måltid för att få en bra absorption.
Gastrointestinala besvär såsom magknip och illamående kan även minska om dosen tas vid måltid.

Vanlig indikation och dos

Dygnsdosen kan fördelas på 2 doseringstillfällen men vid gastrointestinala problem/buksmärta kan det vara en fördel att dygnsdosen fördelas på 3 - 4 doseringstillfällen.

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för erytromycin samt vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:
15 - 25 mg/kg x 2 alt 7,5 - 12,5 mg/kg x 4, max 2 g/dag.

Vid allvarlig infektion kan dosen ökas till 30 (- 50) mg/kg x 2 alt 15 (- 25) mg/kg x 4, max 4 g/dag.

Behandlingstid: 7 - 14 dagar

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-12-12 09:56:59
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-13 13:08:11
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 4471
ID/spårnummer: 4063
Giltig fr o m: 2017-12-13 13:08:11
Utskriftsdatum: 2017-12-13

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Erytromycin oralt

(Abboticin Novum, Ery-Max)

Profylax och behandling av kikhosta

Barn 1 mån - 18 år:

20 - 25 mg/kg x 2 alt 10 - 12,5 mg/kg x 4, max 2 g/dag.

Vid allvarlig infektion kan dosen ökas till 30 (- 50) mg/kg x 2 alt 15 (- 25) mg/kg x 4, max 4 g/dag.

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

Stimulering av tarmmotorik (låg evidens)

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 3 mg/kg x 2 - 4

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress INFPREG

<http://www.medsinet.se/infpreg/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan.janusinfo.se/2017/infektioner/>

Internetadress LäkeMedelsverket, LäkeMedelsboken

<https://lakemedelsboken.se/>

Internetadress RAF, Makrolider

<http://www.sls.se/raf/lakemedel/makrolider/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essential-evidence-plus.com/product/ebm_loe_cf_m?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Erythromycin, J01FA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POC3U98EIVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-12-12 09:56:59

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-13 13:08:11

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 4471

ID/spårnummer: 4063

Giltig fr o m: 2017-12-13 13:08:11

Utskriftsdatum: 2017-12-13

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

