



## Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg

(ex Bioclavid) tablett

Används inte vid misstanke om mononukleos pga risk för erytem.

Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra skiljer sig mellan olika preparat. Detta styr doseringen.

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 875 + 125 mg (ex Bioclavid)

Amoxicillin + klavulansyra finns även som oral suspension, se annan instruktion.

### ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin, långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Vissa tablett har brytskåra, det varierar mellan olika fabrikat. Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljningen, men inte för att få två lika stora doser.

Oralt

Enteralt i sond:

Användning av oral suspension rekommenderas, se annan instruktion.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Amoxicillin+klavulansyra (registrerad produkt)

875 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Bör förvaras i originalförpackningen, vissa preparat är fukt känsliga och/eller ljuskänsliga (se produktresumé för produktspecifika uppgifter).

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doserna nedan avser mängden amoxicillin.

Denna styrka är ett alternativ till främst äldre barn då dosering 2 gånger dagligen är önskvärd. I första hand rekommenderas dock dosering 3 gånger dagligen, se annan instruktion.

Vid dosering som inte överensstämmer med tabletternas styrka rekommenderas oral suspension 80 + 12 mg/mL, se annan instruktion.

#### Bakteriell infektion med bakterier känsliga för amoxicillin och klavulansyra

Barn över 2 mån, under 40 kg: För dosering se instruktion för oral suspension.  
Barn från 40 kg: 875 mg x 2, max 875 mg x 3

Behandlingstid: vanligen 5 - 10 dagar

### ÖVRIG INFORMATION

Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra är 7:1 i denna tablett. Detta förhållande är lämpligt när man önskar dosera två gånger dagligen. Därmed erhålls inte för låg dos klavulansyra.

Det finns även tablett med styrkan 500 + 125 mg (4:1 förhållande). Den lämpar sig bättre för dosering tre gånger dagligen. Vid sväljsvårigheter finns oral suspension som alternativ. För dessa preparat, se andra instruktioner.

Vid GFR under 30 mL/min är det inte lämpligt att använda denna tablett (7:1 förhållande). I dessa fall är preparat med förhållandet 4:1 lämpligare, se andra instruktioner.





## Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Navarro A S, New formulations of amoxicillin/clavulanic acid: a pharmacokinetic and pharmacodynamic review

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16231964>

Rekommendation ,(Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-05-19

ePedID: 4480

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-05-26

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-05-26

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**