



Naloxon oralt 0,1 mg/mL (100 mikrog/mL)

(Extempore) oral lösning

Flera styrkor och administreringssätt kan finnas.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Naloxon APL (extempore - ej lagervara)

0,1 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars se utgångsdatum

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Opioidinducerad förstoppning

Startdos 2 - 3 (- 4) mikrog/kg x 4

Dosen kan dubblas varannan dag till 15 mikrog/kg och dos. Det finns vid enskilda tillfällen behov av högre doser.

Överväg andra läkemedel som Relistor eller Moventig till patienter som inte har tillräcklig effekt av naloxonmixtur.

RIMLIG DOS FÖR 0,1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mikrog/kg	0,02 mL	0,1 mL	0,2 mL	1 mL
4 mikrog/kg	0,04 mL	0,2 mL	0,4 mL	2 mL
15 mikrog/kg	0,15 mL	0,75 mL	1,5 mL	7,5 mL

REFERENS/LÄNK

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Internetadress Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser>

Internetadress Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård: Riktlinjer för smärtbehandling hos barn-akut och postoperativ smärta

<https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/anestesi/smartlindring-av-barn/>

Lokal instruktion, Region Skåne Smärtor i samband med behandling av Vincristin

LOKAL

Rekommendation (Grade 2D)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-02-13 13:42:18

ePedID: 4481

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-14 10:36:02

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-02-14 10:36:02

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT