



## Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj

(Novoseven) rekombinant, AKTIVERAD, hel ampull

**Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.**

**För nyfödda kan det vara aktuellt att ge doser under 1 mg, se annan instruktion.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

NovoSeven 1 mg, 2 mg, 5 mg och 8 mg.  
Samtliga med slutkoncentrationen 1 mg/mL.

Ordnation bör ske i antal mg och avrundas till hela ampuller för att minimera kassation.

#### Beredningsinstruktion:

Ska iordningställas med medföljande vätska.  
Följ instruktionen i bipacksedeln.

Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, eftersom det kan leda till skumbildning.  
Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd den inte om den är grumlig.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: vanligen 1 - 5 min.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

### RIMLIG DOS för Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mg/kg	-	-	1 mg	5 mg

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Novoseven (registrerad produkt)

1 mg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvara pulver och spädningvätska vid högst 25°C i originalförpackning. Ljuskänsligt. Får ej frysas. Efter iordningställande: bör användas omgående, men kan förvaras 6 tim rumstemperatur, 24 tim kylskåp. Detta gäller även styrkorna 2, 5 och 8 mg.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

**Bör ordineras i antal mg och avrundas till hela ampuller.**

#### Hemofili A eller B med antikroppar - Akut behandling

Ges så tidigt som möjligt när en blödningsperiod inträffar.

Vanlig dos: 90 - 100 mikrog/kg = 0,09 - 0,1 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

#### Kongenital faktor VII-brist - Behandling och profylax vid invasiva ingrepp

Vanlig dos: 15 - 30 mikrog/kg = 0,015 - 0,03 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

#### Glanzmanns trombasteni - Behandling och profylax vid invasiva ingrepp

Vanlig dos: 80 - 120 mikrog/kg = 0,08 - 0,12 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

#### Massiv blödning eller vid INR-stegring i särskilda fall (off-label)

OBS! Kontakta alltid koagulationsjour.

Vanlig dos: 100 mikrog/kg = 0,1 mg/kg

### ÖVRIG INFORMATION

Novoseven innehåller rekombinant koagulationsfaktor VIIa kallad eptacog alfa (aktiverad).

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Medicininstruktioner

<https://www.medicininstruktioner.se/>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH), Hemostas vid allvarlig blödning

<http://www.ssth.se/lankar>

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)



## Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj (Novoseven) rekombinant, AKTIVERAD, hel ampull



---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-05-09

ePedID: 4483

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-05-22

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-05-22

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**