

## Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj rekombinant, aktiverat

Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.

För nyfödda kan det vara aktuellt att ge doser under 1 mg, se annan instruktion.

**Instruktionen gäller för:** NovoSeven 1 mg, 2 mg, 5 mg och 8 mg.  
Samtliga med slutkoncentrationen 1 mg/mL.

Ordnation bör ske i hela ampuller för att minimera kassation.

**Beredningsinstruktion:** Ska iordningställas med medföljande vätska.  
Följ instruktionen i bipacksedeln.

Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, eftersom det kan leda till skumbildning.  
Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd den inte om den är grumlig.

**Arbetsmiljö** Biologiskt läkemedel, hantera enligt lokal instruktion, -

### Administreringsätt

Intravenös injektion: vanligen 1 - 5 min.

Vid administrering ska produktnamn samt batchnummer eller motsvarande dokumenteras i journalen.

### Vanlig indikation och dos

**Ordineras i mängd substans (mg). Avrunda om möjligt till hela ampuller.**

#### Hemofili A eller B med antikroppar - Akut behandling

Ges så tidigt som möjligt när en blödningsperiod inträffar.

Vanlig dos: 90 - 100 mikrog/kg = 0,09 - 0,1 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-12-01 14:33:08  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 09:29:13  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4483  
ID/spårnummer: 3996  
Giltig fr o m: 2017-12-05 09:29:13  
Utskriftsdatum: 2017-12-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj rekombinant, aktiverat

### Kongenital faktor VII-brist - Behandling och profylax vid invasiva ingrepp

Vanlig dos: 15 - 30 mikrog/kg = 0,015 - 0,03 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

### Glanzmanns trombasteni - Behandling och profylax vid invasiva ingrepp

Vanlig dos: 80 - 120 mikrog/kg = 0,08 - 0,12 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

### Massiv blödning eller vid INR-stegring i särskilda fall (off-label)

OBS! Kontakta alltid koagulationsjour.

Vanlig dos: 100 mikrog/kg = 0,1 mg/kg

| Rimlig dos för barn | 1 kg      | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|---------------------|-----------|------|-------|-------|
|                     | 0,1 mg/kg |      | 1 mg  | 5 mg  |

### Hållbarhet preparat:

Novoseven (registrerad produkt)

- 1 mg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvara pulver och spädningvätska vid högst 25°C i originalförpackning. Ljuskänsligt. Får ej frysas. Efter iordningställande: bör användas omgående, men kan förvaras 6 tim rumstemperatur, 24 tim kylskåp. Detta gäller även styrkorna 2, 5 och 8 mg.

### Övrig information

Novoseven innehåller rekombinant koagulationsfaktor VIIa kallad eptacog alfa (aktiverad).

### Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH)

<http://www.ssth.se/>

Rekommendation (Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### Substansspecifika uppgifter

Eptacog alfa, B02BD08

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POHKUBQQ4VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-12-01 14:33:08

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 09:29:13

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 4483

ID/spårnummer: 3996

Giltig fr o m: 2017-12-05 09:29:13

Utskriftsdatum: 2017-12-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

