



Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj

(Novoseven) rekombinant, aktiverat

Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.

För nyfödda kan det vara aktuellt att ge doser under 1 mg, se annan instruktion.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

NovoSeven 1 mg, 2 mg, 5 mg och 8 mg.
Samtliga med slutkoncentrationen 1 mg/mL.

Ordnation bör ske i hela ampuller för att minimera kassation.

Beredningsinstruktion:

Ska iordningställas med medföljande vätska.
Följ instruktionen i bipacksedeln.

Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, eftersom det kan leda till skumbildning.
Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd den inte om den är grumlig.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: vanligen 1 - 5 min.

Vid administrering ska produktamn samt batchnummer eller motsvarande dokumenteras i journalen.

ÖVRIG INFORMATION

Novoseven innehåller rekombinant koagulationsfaktor VIIa kallad eptacog alfa (aktiverad).

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Novoseven (registrerad produkt)

1 mg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvara pulver och spädningvätska vid högst 25°C i originalförpackning. Ljuskänsligt. Får ej frysas. Efter iordningställande: bör användas omgående, men kan förvaras 6 tim rumstemperatur, 24 tim kylskåp. Detta gäller även styrkorna 2, 5 och 8 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i mängd substans (mg). Avrunda om möjligt till hela ampuller.

Hemofili A eller B med antikroppar - Akut behandling

Ges så tidigt som möjligt när en blödningsperiod inträffar.

Vanlig dos: 90 - 100 mikrog/kg = 0,09 - 0,1 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

Kongenital faktor VII-brist - Behandling och profylax vid invasiva ingrepp

Vanlig dos: 15 - 30 mikrog/kg = 0,015 - 0,03 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

Glanzmanns trombasteni - Behandling och profylax vid invasiva ingrepp

Vanlig dos: 80 - 120 mikrog/kg = 0,08 - 0,12 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

Massiv blödning eller vid INR-stegring i särskilda fall (off-label)

OBS! Kontakta alltid koagulationsjour.

Vanlig dos: 100 mikrog/kg = 0,1 mg/kg

RIMLIG DOS FÖR 1 mg

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mg/kg	-	-	1 mg	5 mg

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Medicininstruktioner

<https://www.medicininstruktioner.se/>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH)

<http://www.ssth.se/>

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj (Novoseven) rekombinant, aktiverat



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-07-02

ePedID: 4483

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-08-13

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-08-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT